




Gestión Aeronáutica: Estadística Teórica  
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales  
Departamento de Economía Aplicada  
Profesor: Santiago de la Fuente Fernández

## **ESTIMADORES PROPIEDADES. APLICACIÓN**



## ESTIMADORES

Un *estimador* es un estadístico (una función de la muestra) utilizado para estimar un parámetro desconocido de la población.

Por ejemplo, si se desea conocer el precio medio poblacional de un artículo (parámetro desconocido) se recogen observaciones del precio de dicho artículo en diversos establecimientos (muestra) pudiendo utilizarse la media aritmética de las observaciones para estimar el precio medio poblacional.

Para *cada parámetro* pueden existir varios *estimadores diferentes*. En general, se elige el estimador que posea mejores propiedades que los restantes, como insesgadez, eficiencia, convergencia y robustez (consistencia).

El valor de un estimador proporciona una estimación puntual del valor del parámetro en estudio. En general, se realiza la *estimación* mediante un intervalo, es decir, se obtiene un *intervalo* [parámetro muestral  $\pm$  error muestral] dentro del cual se espera se encuentre el valor poblacional dentro de un cierto nivel de confianza. El nivel de confianza es la probabilidad de que a priori el valor poblacional se encuentre contenido en el intervalo.

## PROPIEDADES DE LA ESPERANZA Y VARIANZA

$$a) E[aX_1 \pm bX_2] = E[aX_1] \pm E[bX_2] = aE[X_1] \pm bE[X_2]$$

$$b) \text{Var}[aX_1 \pm bX_2] = \text{Var}[aX_1] + \text{Var}[bX_2] = a^2 \text{Var}[X_1] + b^2 \text{Var}[X_2]$$

## SESGO

Se denomina *sesgo* de un estimador a la diferencia entre la esperanza (valor esperado) del estimador y el verdadero valor del parámetro a estimar. Es deseable que un estimador sea *insesgado* o *centrado*, esto es, que el sesgo sea nulo para que la esperanza del estimador sea igual al valor del parámetro que se desea estimar.

Por ejemplo, si se desea estimar la media de una población, la media aritmética de la muestra es un estimador insesgado de la misma, ya que la esperanza (valor esperado) es igual a la media poblacional.

Si una muestra  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  procede de una población de media  $\mu$ :

$$E[x_i] = \mu \quad \text{para } i = (1, 2, \dots, n)$$

- La media aritmética muestral es un estimador insesgado de la media poblacional:

$$E[\bar{x}] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n} E\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[x_i] = \frac{1}{n} (E[x_1] + E[x_2] + \dots + E[x_n]) = \frac{1}{n} n\mu = \mu$$

- La varianza de una muestra aleatoria simple es un estimador sesgado de la varianza poblacional, siendo su esperanza:

$$\text{La varianza muestral } \sigma_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Para calcular su esperanza matemática se realizan previamente algunos cálculos sumando y restando la esperanza de la variable aleatoria poblacional.

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x} + \mu - \mu)^2}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(x_i - \mu) - (\bar{x} - \mu)]^2$$

Desarrollando el cuadrado:

$$\begin{aligned} \sigma_x^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(x_i - \mu)^2 + (\bar{x} - \mu)^2 - 2(x_i - \mu)(\bar{x} - \mu)] = \\ &= \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 + n(\bar{x} - \mu)^2 - 2(\bar{x} - \mu) \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) \right) = \\ &= \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 + n(\bar{x} - \mu)^2 - 2(\bar{x} - \mu)(n\bar{x} - n\mu) \right) = \\ &= \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 + n\bar{x}^2 + n\mu^2 - \boxed{2n\bar{x}\mu} - 2n\bar{x}^2 + \boxed{2n\bar{x}\mu} + 2n\bar{x}\mu - 2n\mu^2 \right) = \\ &= \frac{1}{n} \left( \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - n(\bar{x} - \mu)^2 \right) \end{aligned}$$

Calculando la esperanza matemática de la varianza muestral  $\sigma_x^2$ :

$$E[\sigma_x^2] = \frac{1}{n} E \left( \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - n(\bar{x} - \mu)^2 \right) = \frac{1}{n} \underbrace{\sum_{i=1}^n E[(x_i - \mu)^2]}_{\text{varianza poblacional}} - \underbrace{E[(\bar{x} - \mu)^2]}_{\text{varianza media muestral}}$$

En el segundo miembro aparecen dos esperanzas, la primera  $E(x_i - \mu)^2$  coincide con la varianza poblacional  $\sigma^2$  al tratarse de una muestra aleatoria simple, la segunda esperanza  $E(\bar{x} - \mu)^2$  es la varianza de la media muestral  $\frac{\sigma^2}{n}$

$$\text{Por tanto, } E[\sigma_x^2] = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

- La cuasivarianza de una muestra aleatoria simple es un estimador insesgado de la varianza poblacional:

$$s_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

La relación entre varianza y cuasivarianza:  $n\sigma_x^2 = (n-1)s_x^2 \quad \mapsto \quad s_x^2 = \frac{n}{n-1}\sigma_x^2$

La esperanza de la cuasivarianza  $s_x^2$  es igual a la varianza poblacional  $\sigma^2$ :

$$E[s_x^2] = E\left[\frac{n}{n-1}\sigma_x^2\right] = \frac{n}{n-1} \cdot E[\sigma_x^2] = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \sigma^2 = \sigma^2$$

Un estimador  $\hat{\theta}$  es *insesgado (centrado)* cuando  $E(\hat{\theta}) = \theta$

Un estimador  $\hat{\theta}$  es *sesgado* cuando  $E(\hat{\theta}) = \theta + \underbrace{b(\hat{\theta})}_{\text{sesgo}} \Rightarrow b(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$

Un estimador  $\hat{\theta}$  es *asintóticamente insesgado* si su posible sesgo tiende a cero al aumentar el tamaño muestral que se calcula:  $\lim_{n \rightarrow \infty} b(\hat{\theta}) = 0$

Sea el estimador  $\hat{\theta} = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n x_i$

$$E(\hat{\theta}) = E\left[\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n+1} E\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n+1} (n\mu) = \frac{n\mu}{n+1}$$

$$b(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \mu = \frac{n\mu}{n+1} - \mu = \frac{n\mu - n\mu - \mu}{n+1} = \underbrace{-\frac{\mu}{n+1}}_{\text{insesgado asintóticamente}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

## ERROR CUADRÁTICO MEDIO DE LOS ESTIMADORES (ECM)

La utilización de la estimación puntual como si fuera el verdadero valor del parámetro conduce a que se pueda cometer un error más o menos grande.

El Error Cuadrático Medio (ECM) de un estimador  $\hat{\theta}$  viene definido:

$$ECM(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = V(\hat{\theta}) + \left[ \underbrace{E(\hat{\theta}) - \theta}_{\text{sesgo}} \right]^2 \quad \text{siendo el sesgo } b(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

Cuando el estimador es centrado, el sesgo  $b(\hat{\theta}) = 0 \rightarrow ECM(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta})$

Un error cuadrático medio pequeño indicará que en media el estimador  $\hat{\theta}$  no se encuentra lejos del parámetro  $\theta$ .

## CONSISTENCIA

Si no es posible emplear estimadores de mínima varianza, el requisito mínimo deseable para un estimador es que a medida que el tamaño de la muestra crece, el valor del estimador tienda a ser el valor del parámetro poblacional, propiedad que se denomina *consistencia*.

Un estimador  $\hat{\theta}$  *consistente* es un estimador asintóticamente insesgado cuya varianza tiende a cero al aumentar el tamaño muestral.

El estimador  $\hat{\theta}$  es *consistente* cuando  $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}) = 0$

## EFICIENCIA

Un estimador es más *eficiente* o más *preciso* que otro estimador, si la varianza del primero es menor que la del segundo.

Sean  $\hat{\theta}_1$  y  $\hat{\theta}_2$  dos estimadores insesgados, se dice que  $\hat{\theta}_1$  es *más eficiente* que  $\hat{\theta}_2$  si se verifica que  $\text{Var}(\hat{\theta}_1) < \text{Var}(\hat{\theta}_2)$

La *eficiencia relativa* se mide por el ratio:  $\frac{\text{Var}(\hat{\theta}_1)}{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}$

La *eficiencia* de los estimadores está limitada por las características de la distribución de probabilidad de la muestra de la que proceden.

Un estimador es eficiente cuando verifica:  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Es insesgado} \\ \text{Posee varianza mínima} \end{array} \right.$

La cuestión de tener varianza mínima queda resuelta mediante la Cota de Cramér-Rao.

La varianza de un estimador verifica siempre la *Cota de Cramér-Rao*:  $V(\hat{\theta}) \geq \text{CCR}$ . Un estimador será *eficiente* cuando  $V(\hat{\theta}) = \text{CCR}$

$$\text{y la cota resulta } V(\hat{\theta}) \geq \text{CCR} = \frac{[1 + b(\hat{\theta})]^2}{nE\left[\frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \theta}\right]^2} = \frac{[1 + b(\hat{\theta})]^2}{E\left[\frac{\partial \ln L(X, \theta)}{\partial \theta}\right]^2}$$

$$\text{Si el estimador es insesgado, } b(\hat{\theta}) = 0: V(\hat{\theta}) \geq \text{CCR} = \frac{1}{nE\left[\frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \theta}\right]^2}$$

$$\text{Y en muestras aleatorias simples: } V(\hat{\theta}) \geq \text{CCR} = \frac{[1 + b(\hat{\theta})]^2}{nE\left[\frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \theta}\right]^2}$$

Es preciso destacar que la *Cota de Cramér-Rao* (CRR) no tiene por qué tomar siempre un valor muy pequeño (cercano a cero).

Un estimador es *asintóticamente eficiente* si:  $\lim_{x \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}) = \text{CCR}$

El denominador de la Cota de Cramér-Rao es la *cantidad de información de Fisher* en una muestra:

$$I(\theta) = E \left[ \frac{\partial \ln L(X, \theta)}{\partial \theta} \right]^2 \quad \text{o bien} \quad i(\theta) = E \left[ \frac{\partial \ln L(x, \theta)}{\partial \theta} \right]^2 \quad \text{donde} \quad I(\theta) = ni(\theta)$$

A la función  $\ln L(X, \theta)$  se llama *soporte* o *log-verosimilitud*

El denominador de la expresión,  $I(\theta)$ , puede simplificarse en una muestra aleatoria simple (m.a.s.), según sea el caso discreto o continuo, obteniendo la expresión:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Discreto:} \quad E \left[ \frac{\partial \ln P(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{\partial \theta} \right]^2 = n \cdot E \left[ \frac{\partial \ln P(x; \theta)}{\partial \theta} \right]^2 \\ \text{Continuo:} \quad E \left[ \frac{\partial \ln f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)}{\partial \theta} \right]^2 = n \cdot E \left[ \frac{\partial \ln f(x; \theta)}{\partial \theta} \right]^2 \end{array} \right.$$

## MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD (EMV)

La estimación por máxima verosimilitud es un método de optimización que supone que la distribución de probabilidad de las observaciones es conocida.

Sea  $(x_1, \dots, x_n)$  una muestra aleatoria (no necesariamente simple) de una población  $X$  con función de masa  $P_\theta$  (o función de densidad  $f_\theta$ ) donde  $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$ .

El estimador de máxima verosimilitud (probabilidad conjunta) de  $\theta$  es el formado por los valores  $(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_n)$  que maximizan la *función de verosimilitud* de la muestra  $(x_1, \dots, x_n)$  obtenida:

$$L(\theta) = L(X; \theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \begin{cases} P(x_1, \theta) \cdots P(x_n, \theta) & \text{caso discreto} \\ f_\theta(x_1) \cdots f_\theta(x_n) & \text{caso continuo} \end{cases}$$

En muchas ocasiones, es más práctico encontrar el estimador de máxima verosimilitud es considerar la función soporte o *log-verosimilitud*  $\ln L(\theta)$ , en lugar de la función de verosimilitud  $L(\theta)$ , ya que es más fácil de manejar y presenta los mismos máximos y mínimos.

Se despeja  $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_n)$  de la ecuación:  $\left. \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} \right|_{\theta=\hat{\theta}} = 0$  y se obtiene el estimador

de máxima verosimilitud E.M.V  $(\hat{\theta})$

## SUFICIENCIA

Un estimador  $\hat{\theta}$  es suficiente cuando no da lugar a una pérdida de información. Es decir, cuando la información basada en  $\hat{\theta}$  es tan buena como la que hiciera uso de toda la muestra.

Para identificar estadísticos suficientes se utiliza el criterio de factorización de Fisher-Neyman, que dice que dada una muestra aleatoria  $(x_1, \dots, x_n)$  de una población  $X$  con función de masa  $P_\theta$  (o función de densidad  $f_\theta$ ) un estadístico  $\hat{\theta}$  es suficiente para  $\theta$  si y sólo si:

$$\begin{cases} P_\theta(x_1, \dots, x_n) = g[\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n), \theta] \cdot h(x_1, \dots, x_n) & \text{caso discreto} \\ f_\theta(x_1, \dots, x_n) = g[\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n), \theta] \cdot h(x_1, \dots, x_n) & \text{caso continuo} \end{cases}$$

Para encontrar un estadístico suficiente  $\hat{\theta}$  hay que factorizar la función de verosimilitud de la forma:  $L(\theta) = g(\hat{\theta}, \theta) \cdot h(x_1, \dots, x_n)$

## MÉTODO DE LOS MOMENTOS

El procedimiento consiste en igualar momentos poblacionales respecto al origen ( $\alpha_r$ ) a los correspondientes momentos muestrales respecto al origen ( $a_r$ ), formando así tantas ecuaciones como parámetros poblacionales se pretenden estimar:

$$\begin{cases} \alpha_1 = E(X) = \mu \rightarrow \hat{\alpha}_1 = a_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x} \\ \alpha_2 = E(X^2) \rightarrow \hat{\alpha}_2 = a_2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} \\ \dots \rightarrow \dots \\ \alpha_r = E(X^r) \rightarrow \hat{\alpha}_r = a_r = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^r}{n} \end{cases}$$

## CÁLCULO DE LA INSESGADEZ y EFICIENCIA DE LOS ESTIMADORES

1.- La variable aleatoria poblacional "renta de las familias" del municipio de Madrid se distribuye siguiendo un modelo  $N(\mu, \sigma^2)$ . Se extraen muestras aleatorias simples de tamaño 4. Como estimadores del parámetro  $\mu$ , se proponen los siguientes:

$$\hat{\mu}_1 = \frac{x_1 + 2x_2 + 3x_3}{6}$$

$$\hat{\mu}_2 = \frac{x_3 - 4x_2}{-3}$$

$$\hat{\mu}_3 = \bar{x}$$

Se pide:

- Comprobar si los estimadores son insesgados
- ¿Cuál es el más eficiente?
- Si tuviera que escoger entre ellos, ¿cuál escogería?. Razone su respuesta a partir del Error Cuadrático Medio.

Solución:

- a) Un estimador  $\hat{\theta}$  es insesgado (o centrado) cuando se verifica  $E(\hat{\theta}) = \theta$

$$\begin{aligned}
 E(\hat{\mu}_1) &= E\left[\frac{x_1 + 2x_2 + 3x_3}{6}\right] = \frac{1}{6} E[x_1 + 2x_2 + 3x_3] = \\
 &= \frac{1}{6} [E(x_1) + 2E(x_2) + 3E(x_3)] = \frac{1}{6} [6\mu] = \mu
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(\hat{\mu}_2) &= E\left[\frac{x_3 - 4x_2}{-3}\right] = -\frac{1}{3} E[x_3 - 4x_2] = -\frac{1}{3} [E(x_3) - 4E(x_2)] = \\
 &= -\frac{1}{3} [-3\mu] = \mu
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(\hat{\mu}_3) &= E\left[\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}\right] = \frac{1}{4} E[x_1 + x_2 + x_3 + x_4] = \\
 &= \frac{1}{4} [E(x_1) + E(x_2) + E(x_3) + E(x_4)] = \frac{1}{4} [4\mu] = \mu
 \end{aligned}$$

Los tres estimadores son insesgados o centrados.

- b) El estimador *más eficiente* es el que tenga menor varianza.



$$V[\hat{\mu}_1] = V\left[\frac{x_1 + 2x_2 + 3x_3}{6}\right] = \frac{1}{36} V[x_1 + 2x_2 + 3x_3] = \\ = \frac{1}{36} [V(x_1) + 4V(x_2) + 9V(x_3)] = \frac{1}{36} [14\sigma^2] = \frac{14}{36}\sigma^2 = 0,39\sigma^2$$

$$V[\hat{\mu}_2] = V\left[\frac{x_1 - 4x_2}{-3}\right] = \frac{1}{9} V[x_1 - 4x_2] = \frac{1}{9} [V(x_1) + 16V(x_2)] = \\ = \frac{1}{9} [17\sigma^2] = \frac{17}{9}\sigma^2 = 1,89\sigma^2$$

$$V[\hat{\mu}_3] = V\left[\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}\right] = \frac{1}{16} V[x_1 + x_2 + x_3 + x_4] = \\ = \frac{1}{16} [V(x_1) + V(x_2) + V(x_3) + V(x_4)] = \frac{1}{16} [4\sigma^2] = \frac{4}{16}\sigma^2 = 0,25\sigma^2$$

El estimador  $\hat{\mu}_3$  es el más eficiente.

c) Se elige el estimador que presente menor Error Cuadrático Medio (ECM)

$$\text{ECM}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = V(\hat{\theta}) + \underbrace{\left[ \frac{E(\hat{\theta}) - \theta}{\text{sesgo}} \right]^2}_{\text{sesgo } b(\hat{\theta}) = [E(\hat{\theta}) - \theta]}$$

Si  $\underbrace{E(\hat{\theta}) = \theta}_{\text{insesgado}} \Rightarrow \text{ECM}(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta})$

Al ser los tres estimadores insesgados (centrados), se elige al que menor varianza presenta, que coincidirá con el que menor ECM tiene, es decir, se opta por el estimador  $\hat{\mu}_3$

Adviértase que si el estimador  $\hat{\theta}$  es insesgado:  $\text{ECM}(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta})$

## ESTIMADORES SESGADOS: CÁLCULO DEL SESGO Y ESTIMACIÓN PUNTUAL

2.- La variable aleatoria  $X$  representa los gastos mensuales de una empresa, cuya función de densidad es  $f(\theta, x) = \theta x^{\theta-1}$  con  $\theta > 0$  y  $0 < x < 1$ . Se realiza una m.a.s. de tamaño 3, y se proponen tres estimadores:

$$\hat{\theta}_1 = \bar{x}$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2}{6}$$

$$\hat{\theta}_3 = \frac{x_3 - 2x_1 + 4x_2}{6}$$

- Calcule los sesgos
- Si la muestra que se obtiene es (0,7 ; 0,1 ; 0,3), calcule las estimaciones puntuales
- ¿Cuáles son las funciones estimadas para las estimaciones anteriores?

Solución:

Un estimador  $\hat{\theta}$  es insesgado (centrado) cuando  $E(\hat{\theta}) = \theta$ .

Un estimador  $\hat{\theta}$  es sesgado cuando  $E(\hat{\theta}) = \theta + \underbrace{b(\hat{\theta})}_{\text{sesgo}} \Rightarrow b(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$

$X =$  "gastos mensuales de la empresa"

$f(\theta, x) = \theta x^{\theta-1}$  con  $\theta > 0$  y  $0 < x < 1$  m.a.s. con  $n = 3$

- Sesgo del estimador  $\hat{\theta}_1 = \bar{x}$

$$\hat{\theta}_1 = \bar{x} \Rightarrow E(\hat{\theta}_1) = E\left[\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}\right] = \frac{1}{3} E[x_1 + x_2 + x_3] = \frac{1}{3} (3\mu) = \mu \text{ (media poblacional)}$$

donde

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, \theta) dx = \int_0^1 x f(x, \theta) dx = \int_0^1 x \theta x^{\theta-1} dx = \int_0^1 \theta x^{\theta} dx = \left[\frac{\theta x^{\theta+1}}{\theta+1}\right]_0^1 = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\text{El sesgo: } b(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_1) - \theta = \frac{\theta}{\theta+1} - \theta = -\frac{\theta^2}{\theta+1}$$

- Sesgo del estimador  $\hat{\theta}_2 = \frac{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2}{6}$

$$E(\hat{\theta}_2) = E\left[\frac{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2}{6}\right] = \frac{1}{6} \left[ \underbrace{E(x_1^2)}_{\alpha_2} + 2 \underbrace{E(x_2^2)}_{\alpha_2} + 3 \underbrace{E(x_3^2)}_{\alpha_2} \right] = \frac{1}{6} (6\alpha_2) = \alpha_2 (*)$$

donde  $\alpha_2$  es el momento de orden 2 respecto al origen.

$$\begin{aligned}\alpha_2 = E(x^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x, \theta) dx = \int_0^1 x^2 f(x, \theta) dx = \int_0^1 x^2 \theta x^{\theta-1} dx = \int_0^1 \theta x^{\theta+1} dx = \\ &= \left[ \frac{\theta x^{\theta+2}}{\theta+2} \right]_0^1 = \frac{\theta}{\theta+2}\end{aligned}$$

entonces,

$$E(\hat{\theta}_2) = E\left[\frac{x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2}{6}\right] = \frac{1}{6} \left[ \underbrace{E(x_1^2)}_{\alpha_2} + 2\underbrace{E(x_2^2)}_{\alpha_2} + 3\underbrace{E(x_3^2)}_{\alpha_2} \right] = \alpha_2 = \frac{\theta}{\theta+2}$$

$$\text{El sesgo: } b(\hat{\theta}_2) = E(\hat{\theta}_2) - \theta = \frac{\theta}{\theta+2} - \theta = -\frac{\theta^2 + \theta}{\theta+2}$$

▪ Sesgo del estimador  $\hat{\theta}_3 = \frac{x_3 - 2x_1 + 4x_2}{6}$

$$E(\hat{\theta}_3) = E\left[\frac{x_3 - 2x_1 + 4x_2}{6}\right] = \frac{1}{6} E[x_3 - 2x_1 + 4x_2] = \frac{1}{6} (3\mu) = \frac{1}{2} \mu$$

$$\mu = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, \theta) dx = \int_0^1 x f(x, \theta) dx = \int_0^1 x \theta x^{\theta-1} dx = \int_0^1 \theta x^{\theta} dx = \left[ \frac{\theta x^{\theta+1}}{\theta+1} \right]_0^1 = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\text{El sesgo: } b(\hat{\theta}_3) = E(\hat{\theta}_3) - \theta = \frac{1}{2} \left( \frac{\theta}{\theta+1} \right) - \theta = -\frac{2\theta^2 + \theta}{2(\theta+1)}$$

b) Si la muestra que se obtiene es (0,7 ; 0,1 ; 0,3), calcule las estimaciones puntuales.

$$\hat{\theta}_1 = \frac{0,7 + 0,1 + 0,3}{3} = 0,367$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{0,7^2 + 2 \cdot 0,1^2 + 3 \cdot 0,3^2}{6} = 0,13$$

$$\hat{\theta}_3 = \frac{0,3 - 2 \cdot 0,7 + 4 \cdot 0,1}{6} = -0,117 \mapsto \text{no puede ser, puesto que } \hat{\theta} > 0$$

c) ¿Cuáles son las funciones estimadas para las estimaciones anteriores?

$$\hat{\theta}_1 \Rightarrow f(0,367, x) = 0,367 x^{0,367-1} = 0,367 x^{-0,633}$$

$$\hat{\theta}_2 \Rightarrow f(0,13, x) = 0,13 x^{0,13-1} = 0,13 x^{-0,87}$$

3.- En una población se presenta una alteración leve en una cierta proporción  $p$  de los individuos que la componen. Se define una variable aleatoria  $X$  que vale 1 para los individuos alterados y 0 para los individuos no alterados. Se pide:

- Distribución poblacional de la variable aleatoria
- Si  $\hat{p}$  es la proporción de veces que aparece el valor 1 en muestras aleatorias de tamaño 3. Hallar la distribución en el muestreo de  $\hat{p}$ , suponiendo que  $p = 0,2$
- Demostrar que en este caso  $\hat{p}$  es un estimador insesgado de  $p$
- Repetir los pasos b) y c) de forma general para un valor cualquiera de  $p$

Solución:

a) La distribución poblacional

$x_i$	$p_i$
0	0,8
1	0,2

b) Se elabora una tabla con las posibles muestras de tamaño 3, junto con la probabilidad de las muestras y el valor de la proporción muestral en cada una de ellas.

$$\Omega = \{(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (1,0,0), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)\}$$

Muestra	Probabilidad	$\hat{p}$
(0, 0, 0)	$0,8^3 = 0,512$	0
(0, 0, 1)	$0,8^2 \cdot 0,2 = 0,128$	1/3
(0, 1, 0)	$0,8^2 \cdot 0,2 = 0,128$	1/3
(1, 0, 0)	$0,2 \cdot 0,8^2 = 0,128$	1/3
(0, 1, 1)	$0,8 \cdot 0,2^2 = 0,032$	2/3
(1, 0, 1)	$0,2^2 \cdot 0,8 = 0,032$	2/3
(1, 1, 0)	$0,2^2 \cdot 0,8 = 0,032$	2/3
(1, 1, 1)	$0,2^3 = 0,008$	1

La distribución en el muestreo de  $\hat{p}$ :

$\hat{p}$	$P(\hat{p} = x_i)$	$\hat{p} \cdot P(\hat{p} = x_i)$
0	0,512	0
1/3	0,384	0,128
2/3	0,096	0,064
1	0,008	0,008
		0,2

c) La esperanza matemática  $E(\hat{p}) = \sum_{i=1}^4 (\hat{p} = x_i) \cdot P(\hat{p} = x_i) = 0,2 = p$

quedando demostrado que es un estimador insesgado o centrado de  $p$

d) En un caso genérico, la distribución en el muestreo será:

$\hat{p}$	$P(\hat{p} = x_i)$	$\hat{p} \cdot P(\hat{p} = x_i)$
0	$q^3$	0
1/3	$3pq^2$	$pq^2$
2/3	$3p^2q$	$2p^2q$
1	$p^3$	$p^3$
		$pq^2 + 2p^2q + p^3$

$$E(\hat{p}) = \sum_{i=1}^4 (\hat{p} = x_i) \cdot P(\hat{p} = x_i) = pq^2 + 2p^2q + p^3 = p(q^2 + 2pq + p^2) = p(q+p)^2 = p$$

## CÁLCULO EFICIENCIA RELATIVA Y ERROR CUÁDRATICO MEDIO

4.- Sea una población con media  $\mu$  de la que se extraen m.a.s. de tamaño  $n$ . Considere los siguientes estimadores de la media:

$$\hat{\mu}_1 = \bar{x} \qquad \hat{\mu}_2 = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n x_i$$

- Estudie la insesgadez, la eficiencia relativa y la consistencia de ambos estimadores
- Elija uno de los dos en término del error cuadrático medio

Solución:

- Insesgadez

Un estimador  $\hat{\theta}$  es insesgado (o centrado) cuando se verifica  $E(\hat{\theta}) = \theta$

Un estimador  $\hat{\theta}$  es sesgado cuando  $E(\hat{\theta}) = \theta + \underbrace{b(\hat{\theta})}_{\text{sesgo}} \Rightarrow \underbrace{b(\hat{\theta})}_{\text{sesgo}} = E(\hat{\theta}) - \theta$

Un estimador  $\hat{\theta}$  es *asintóticamente insesgado* si su posible sesgo tiende a cero al aumentar el tamaño muestral que se calcula:  $\lim_{n \rightarrow \infty} b(\hat{\theta}) = 0$

$$E(\hat{\mu}_1) = E(\bar{x}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} (n\mu) = \mu$$

$$b(\hat{\mu}_1) = E(\hat{\mu}_1) - \mu = \mu - \mu = 0$$

$$E(\hat{\mu}_2) = E\left(\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n+1} E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n+1} (n\mu) = \frac{n\mu}{n+1}$$

$$b(\hat{\mu}_2) = E(\hat{\mu}_2) - \mu = \frac{n\mu}{n+1} - \mu = \frac{n\mu - n\mu - \mu}{n+1} = \underbrace{\frac{-\mu}{n+1}}_{\substack{\text{sesgado} \\ \text{asintóticamente}}} \rightarrow 0 \text{ cuando 'n' aumenta}$$

- Eficiencia

Sean  $\hat{\theta}_1$  y  $\hat{\theta}_2$  dos estimadores insesgados de un parámetro desconocido  $\theta$ .

Decimos que  $\hat{\theta}_1$  es *más eficiente* que  $\hat{\theta}_2$  si se verifica que  $\text{Var}(\hat{\theta}_1) < \text{Var}(\hat{\theta}_2)$

La *eficiencia relativa* se mide por el ratio:  $\frac{\text{Var}(\hat{\theta}_1)}{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}$

$$V(\hat{\mu}_1) = V(\bar{x}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(x_i) = \frac{1}{n^2} (n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$V(\hat{\mu}_2) = V\left(\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{(n+1)^2} \sum_{i=1}^n V(x_i) = \frac{1}{(n+1)^2} (n\sigma^2) = \frac{n}{(n+1)^2} \sigma^2$$

$$\text{eficiencia relativa} \equiv \frac{\text{Var}(\hat{\mu}_1)}{\text{Var}(\hat{\mu}_2)} = \frac{\sigma^2/n}{n\sigma^2/(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2}{n^2} > 1 \mapsto \text{Var}(\hat{\mu}_1) > \text{Var}(\hat{\mu}_2)$$

El estimador  $\hat{\mu}_2$  tiene menor varianza, por lo que es *más eficiente* que  $\hat{\mu}_1$

- Consistencia

Un estimador  $\hat{\theta}$  *consistente* es un estimador asintóticamente insesgado cuya varianza tiende a cero al aumentar el tamaño muestral.

El estimador  $\hat{\theta}$  es *consistente* cuando  $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}) = 0$

$$\hat{\mu}_1 \equiv \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} E(\bar{x}) = \mu \\ \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\mu}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0 \end{cases} \quad \text{es consistente}$$

$$\hat{\mu}_2 \equiv \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \mu - \frac{1}{n+1} \mu \right) = \mu \\ \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\mu}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{n}{(n+1)^2} \sigma^2 \right] = 0 \end{cases} \quad \text{es consistente}$$

b) Elegir uno de los dos en término del error cuadrático medio.

El Error Cuadrático Medio (ECM) de un estimador  $\hat{\theta}$  viene definido:

$$\text{ECM}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = V(\hat{\theta}) + \left[ \underbrace{E(\hat{\theta}) - \theta}_{\text{sesgo}} \right]^2 \quad \text{sesgo } b(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

$$\text{Si } \underbrace{E(\hat{\theta}) = \theta}_{\text{insesgado}} \Rightarrow \text{ECM}(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta})$$

$$\text{ECM}(\hat{\mu}_1) = V(\hat{\mu}_1) + [b(\hat{\mu}_1)]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + 0 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$\text{ECM}(\hat{\mu}_2) = V(\hat{\mu}_2) + [b(\hat{\mu}_2)]^2 = \frac{n}{(n+1)^2} \sigma^2 + \left( \frac{1}{n+1} \mu \right)^2 = \frac{n\sigma^2 + \mu^2}{(n+1)^2}$$

El estimador  $\hat{\mu}_1$  será el que presenta menor ECM cuando  $\text{ECM}(\hat{\mu}_1) \leq \text{ECM}(\hat{\mu}_2)$

En esta línea,

$$\frac{\sigma^2}{n} \leq \frac{n\sigma^2 + \mu^2}{(n+1)^2} = \frac{n\sigma^2}{(n+1)^2} + \frac{\mu^2}{(n+1)^2} \Rightarrow \frac{\sigma^2}{n} - \frac{n\sigma^2}{(n+1)^2} \leq \frac{\mu^2}{(n+1)^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{(n+1)^2 \sigma^2 - n^2 \sigma^2}{n(n+1)^2} \leq \frac{\mu^2}{(n+1)^2} \Rightarrow \frac{(n+1)^2 - n^2}{n} \sigma^2 \leq \mu^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{2n+1}{n} \sigma^2 \leq \mu^2 \Rightarrow \frac{2n+1}{n} \leq \frac{\mu^2}{\sigma^2}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Si } \frac{2n+1}{n} \leq \frac{\mu^2}{\sigma^2} \mapsto \hat{\mu}_1 \text{ se elige antes que } \hat{\mu}_2 \\ \text{Si } \frac{2n+1}{n} \geq \frac{\mu^2}{\sigma^2} \mapsto \hat{\mu}_2 \text{ se elige antes que } \hat{\mu}_1 \end{array} \right.$$

5.- Sea  $x_1, x_2, \dots, x_n$  una muestra aleatoria simple de una variable aleatoria  $X$  con  $E(X) = \mu$  y  $\text{Var}(X) = \sigma^2$ . Calcular el error cuadrático medio para los siguientes estimadores de  $\mu$ :

$$\hat{\mu}_1 = x_1 \quad \hat{\mu}_2 = \frac{3x_1 - 2x_2 + x_3}{6}$$

Solución:

a) Estudio de la insesgadez

$$E(\hat{\mu}_1) = E(x_1) = \mu \mapsto b(\hat{\mu}_1) = 0$$

$$E(\hat{\mu}_2) = E\left[\frac{3x_1 - 2x_2 + x_3}{6}\right] = \frac{1}{6} [3E(x_1) - 2E(x_2) + E(x_3)] = \frac{1}{6} (3\mu - 2\mu + \mu) = \frac{2}{6}\mu = \frac{1}{3}\mu$$

$$b(\hat{\mu}_2) = E(\hat{\mu}_2) - \mu = \frac{1}{3}\mu - \mu = -\frac{2}{3}\mu$$

Respecto al sesgo es mejor el primer estimador  $\hat{\mu}_1$  que es insesgado o centrado.

b) Estudio de la varianza

$$\text{Var}(\mu_1) = \sigma^2$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\mu_2) &= \text{Var}\left(\frac{3x_1 - 2x_2 + x_3}{6}\right) = \frac{1}{36} \text{Var}(3x_1 - 2x_2 + x_3) = \frac{1}{36} [9\text{Var}(x_1) + 4\text{Var}(x_2) + \text{Var}(x_3)] = \\ &= \frac{1}{36} [9\sigma^2 + 4\sigma^2 + \sigma^2] = \frac{14}{36}\sigma^2 = \frac{7}{18}\sigma^2 \end{aligned}$$

Respecto a la varianza es mejor el segundo estimador  $\hat{\mu}_1$  por ser  $\frac{7}{18}\sigma^2 < \sigma^2$

El mejor estimador será el que presente menor Error Cuadrático Medio (ECM):

$$\text{ECM}(\hat{\mu}_1) = V(\hat{\mu}_1) + [b(\hat{\mu}_1)]^2 = \sigma^2 + 0 = \sigma^2$$

$$\text{ECM}(\hat{\mu}_2) = V(\hat{\mu}_2) + [b(\hat{\mu}_2)]^2 = \frac{7}{18}\sigma^2 + \left(-\frac{2}{3}\mu\right)^2 = \frac{7}{18}\sigma^2 + \frac{4}{9}\mu^2$$

El primer estimador  $\mu_1$  será mejor si  $\sigma^2 < \frac{7}{18}\sigma^2 + \frac{4}{9}\mu^2 \quad \mapsto \quad \frac{11}{18}\sigma^2 < \frac{4}{9}\mu^2$

$$\sigma^2 < \frac{4 \times 18}{9 \times 11}\mu^2 \quad \mapsto \quad \sigma^2 < \frac{8}{11}\mu^2$$

**6.-** Sea  $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$  una muestra aleatoria simple de una variable aleatoria  $X$  con distribución normal con media  $(\mu - 5)$  y varianza  $\sigma^2$ . Se proponen los siguientes estimadores:

$$\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^5 x_i \quad \hat{\mu}_2 = 8x_2 - 3x_5$$

Determinar cuál es el mejor estimador para  $\mu$ . Justificar la respuesta.

Solución:

a) Estudio de la insesgadez

$$E(\hat{\mu}_1) = E\left(\sum_{i=1}^5 x_i\right) = E(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) = 5(\mu - 5)$$

$$E(\hat{\mu}_2) = E[8x_2 - 3x_5] = 8E(x_2) - 3E(x_5) = 8(\mu - 5) - 3(\mu - 5) = 5(\mu - 5)$$

ambos estimadores son sesgados, con idéntico sesgo:

$$b(\hat{\mu}_1) = b(\hat{\mu}_2) = 5(\mu - 5) - \mu = 4\mu - 25$$

b) Estudio de la varianza

$$\text{Var}(\mu_1) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^5 x_i\right) = 5 \text{Var}(x) = 5\sigma^2$$

$$\text{Var}(\mu_2) = \text{Var}(8x_2 - 3x_5) = 8^2 \text{Var}(x_2) + 3^2 \text{Var}(x_5) = 64\sigma^2 + 9\sigma^2 = 73\sigma^2$$

Dado que los dos estimadores tienen el mismo sesgo y el primer estimador  $\mu_1$  tiene menor varianza, será el estimador óptimo.



Puede observarse que presenta el menor Error Cuadrático Medio:

$$ECM(\hat{\mu}_1) = V(\hat{\mu}_1) + [b(\hat{\mu}_1)]^2 = 5\sigma^2 + (4\mu - 25)^2$$

## CÁLCULO INSESGADEZ E EFICIENCIA

7.- El peso en kilos de los jamones vendidos por una empresa sigue una distribución normal con varianza 4 y peso medio desconocido. Se conoce que el peso medio de los jamones vendidos es superior a 5 kg, y se toman m.a.s. de tamaño 4 para estimar  $\theta$ . ¿Cuál de los dos estimadores sería el mejor respondiendo a la inexactitud y eficiencia?

$$\hat{\theta}_1 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{4} \quad \hat{\theta}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2}$$

Solución:

Un estimador es insesgado (centrado) si  $E(\hat{\theta}) = \theta$

Un estimador es sesgado si  $E(\hat{\theta}) = \theta + b(\hat{\theta}) \mapsto \underbrace{b(\hat{\theta})}_{\text{sesgo}} = E(\hat{\theta}) - \theta$

La v.a  $X_i$  = 'peso en kg de los jamones' sigue una distribución normal de varianza 4

Para estudiar la inexactitud de los estimadores se calculan sus esperanzas:

$$\bullet E(\hat{\theta}_1) = E\left[\frac{X_1 + X_2 + X_3}{4}\right] = \frac{1}{4} [E(X_1) + E(X_2) + E(X_3)] = \frac{3}{4} \theta$$

El sesgo del estimador  $\hat{\theta}_1$  será:  $b(\hat{\theta}_1) = E(\hat{\theta}_1) - \theta = \frac{3}{4} \theta - \theta = -\frac{1}{4} \theta$

$$\bullet E(\hat{\theta}_2) = E\left[\frac{X_1 + X_2}{2}\right] = \frac{1}{2} [E(X_1) + E(X_2)] = \frac{2}{2} \theta = \theta$$

El estimador  $\hat{\theta}_2$  es insesgado,  $b(\hat{\theta}_2) = 0$

Atendiendo al sesgo se elige  $\hat{\theta}_2$

Para analizar la eficiencia relativa de los dos estimadores se calculan las respectivas varianzas

$$V(\hat{\theta}_1) = V\left[\frac{X_1 + X_2 + X_3}{4}\right] = \frac{1}{16} \underbrace{\left[V(X_1 + X_2 + X_3)\right]}_{\substack{\text{las observaciones} \\ \text{son independientes}}} = \frac{1}{16} [V(X_1) + V(X_2) + V(X_3)] =$$

$$\stackrel{V(X_i)=4}{=} \frac{1}{16} 12 = \frac{12}{16} = \frac{3}{4}$$

$$V(\hat{\theta}_2) = V\left[\frac{x_1 + x_2}{2}\right] = \frac{1}{4} \left[ \underbrace{V(x_1 + x_2)}_{\substack{\text{las observaciones} \\ \text{son independientes}}} \right] = \frac{1}{4} [V(x_1) + V(x_2)] \stackrel{V(x_i)=4}{=} \frac{1}{4} 8 = 2$$

Respecto a la varianza se elige el estimador  $\hat{\theta}_1$  por ser el de menor varianza.

Aparecen propiedades contrapuestas, de modo que el estimador insesgado  $\hat{\theta}_2$  es el de mayor varianza. Se elige el estimador en base al error cuadrático medio (ECM):

$$\text{ECM} = \text{Varianza} + (\text{sesgo})^2 \equiv \begin{cases} \text{ECM}(\hat{\theta}_1) = \frac{3}{4} + \left(-\frac{\theta}{4}\right)^2 = \frac{\theta^2 + 12}{16} \\ \text{ECM}(\hat{\theta}_2) = 2 + 0 = 2 \end{cases}$$

Se analiza cuando es mayor el ECM del primer estimador  $\hat{\theta}_1$ :  $\text{ECM}(\hat{\theta}_1) > \text{ECM}(\hat{\theta}_2)$

$$\frac{\theta^2 + 12}{16} > 2 \Rightarrow \theta^2 > 20 \Rightarrow |\theta| > \sqrt{20} \approx 4,47$$

Si  $\theta$  es en valor absoluto mayor que 4,47, el error cuadrático medio de  $\hat{\theta}_1$  es mayor, con lo que se elige el estimador  $\hat{\theta}_2$ .

Se conoce que el peso medio de los jamones es superior a 5 kg, no queda duda que el estimador a elegir (con menor error cuadrático medio) es  $\hat{\theta}_2$ .

8.- La distribución del peso de las manzanas de una determinada cosecha sigue una distribución normal, cuyo peso medio es desconocido y cuya desviación típica es 7 gramos. Se pide:

a) Analizar cuál de los estimadores  $\hat{\mu}_1$ ,  $\hat{\mu}_2$  del peso medio es mejor respecto del sesgo y de la eficiencia, para una muestra aleatoria simple de tamaño cinco.

b) Si  $\hat{\mu}_1 = \frac{\sum_{i=1}^5 X_i}{5}$  y  $\hat{\mu}_2 = x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 - x_5$ , obtener los pesos medios estimados a partir de la siguiente muestra (125, 135, 130, 137, 142).

Solución:

a) El peso de las manzanas sigue una distribución  $N(\mu, 7)$

Se calculan las esperanzas de los estimadores para analizar el sesgo de los estimadores

$$E(\hat{\mu}_1) = E\left[\sum_{i=1}^5 x_i / 5\right] = \frac{1}{5} E\left[\sum_{i=1}^5 x_i\right] = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 E[x_i] \stackrel{E(x_i) = \mu}{=} \frac{1}{5}(5\mu) = \mu$$

$$E(\hat{\mu}_2) = E(x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 - x_5) = E(x_1) + 2E(x_2) + 3E(x_3) - 4E(x_4) - E(x_5) = \\ = \mu + 2\mu + 3\mu - 4\mu - \mu = \mu$$

Los estimadores  $\hat{\mu}_1$ ,  $\hat{\mu}_2$  son insesgados (centrados).

b) Para analizar la eficiencia de los estimadores se obtienen las varianzas:

$$V(\hat{\mu}_1) = V\left[\sum_{i=1}^5 x_i / 5\right] = \frac{1}{25} V\left[\sum_{i=1}^5 x_i\right] = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^5 V[x_i] \stackrel{V(x_i) = 7^2}{=} \frac{1}{25}(5 \cdot 49) = \frac{49}{5}$$

$$V(\hat{\mu}_2) = V(x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 - x_5) = V(x_1) + 4V(x_2) + 9V(x_3) + 16V(x_4) + V(x_5) = \\ = (49) + 4(49) + 9(49) + 16(49) + (49) = 31(49) = 1519$$

Como los dos estimadores son insesgados y  $V(\hat{\mu}_1) < V(\hat{\mu}_2)$  se elige como mejor el estimador  $\hat{\mu}_1$ , el peso medio de la muestra de las cinco manzanas.

**9.-** Supongamos que la distribución de ingresos de una cierta población es una variable aleatoria con media  $\mu$  desconocida y varianza  $\sigma^2$  también desconocida. Si queremos estimar el ingreso medio de la población mediante una m.a.s. de tamaño  $n$ , respecto de la insesgader y de la eficiencia. ¿Cuál de los dos estimadores elegiríamos? ¿Son consistentes?

$$\hat{\mu}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n-1} \quad \hat{\mu}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Solución:

La v.a  $x_i$  = 'ingresos de cierta población' sigue una distribución normal  $N(\mu, \sigma)$

Para analizar el sesgo de los estimadores, hallamos la esperanza:

$$E(\hat{\mu}_1) = E\left[\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n-1}\right] = \frac{1}{n-1} E\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n-1} (n\mu) = \frac{n}{n-1} \mu$$

El sesgo del estimador  $\hat{\mu}_1$  será:  $b(\hat{\mu}_1) = E(\hat{\mu}_1) - \mu = \frac{n}{n-1} \mu - \mu = \frac{1}{n-1} \mu$

$$E(\hat{\mu}_2) = E\left[\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right] = \frac{1}{n} E\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} (n\mu) = \mu$$

El estimador  $\hat{\mu}_2$ , que es la media muestral, es insesgado (centrado).

- La eficiencia de los estimadores se analiza a través de su varianza:

$$V(\hat{\mu}_1) = V\left[\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n-1}\right] = \frac{1}{(n-1)^2} V\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^n V(x_i) = \frac{1}{(n-1)^2} (n\sigma^2) = \frac{n\sigma^2}{(n-1)^2}$$

$$V(\hat{\mu}_2) = V\left[\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right] = \frac{1}{n^2} V\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(x_i) = \frac{1}{n^2} (n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$$

El estimador más eficiente será el de menor varianza. Comparando las varianzas de los estimadores:

$$V(\hat{\mu}_2) = \frac{\sigma^2}{n} < \frac{n\sigma^2}{(n-1)^2} = V(\hat{\mu}_1) \text{ puesto que } (n-1)^2 < n^2$$

El estimador  $\hat{\mu}_2$ , que es la media muestral, es el mejor tanto al sesgo como a la eficiencia.

Los dos estimadores son consistentes: 
$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_1) = \mu & \text{y} & \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\mu}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sigma^2}{(n-1)^2} = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_2) = \mu & \text{y} & \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\mu}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0 \end{cases}$$

## COMPRESIÓN DE LA VEROSIMILITUD. CÁLCULO DE LOS ESTIMADORES MÁXIMO VERSOSÍMILES. PROPIEDADES

10.- Una urna contiene bolas blancas y negras. Sea  $p$  la probabilidad de extraer una bola blanca cuando se realiza una extracción al azar. Asociado a este experimento aleatorio tenemos la variable aleatoria  $X$  que puede tomar los valores:

$X = 1$  si la bola extraída es blanca

$X = 0$  si la bola extraída es negra

La distribución de probabilidad será una  $B(1; p)$ :  $P(X = x) = p^x (1-p)^{1-x}$

Se selecciona una muestra aleatoria con reemplazamiento de tamaño 3  $(x_1, x_2, x_3)$ , siendo  $x_i$  la variable aleatoria a la extracción  $i$ -ésima, y suponemos que ha resultado la siguiente relación (B, N, B). Como el parámetro  $p$  es desconocido pretendemos saber, entre los valores,  $p = 0,65$  y  $p = 0,73$  qué valor hace más probable la aparición de dicha extracción.

Solución:

Si la muestra (B, N, B) es independiente, siendo  $\begin{cases} P(B) = p \\ P(N) = 1-p \end{cases}$

$$P(B, N, B) = P(B \cap N \cap B) = P(B) \cdot P(N) \cdot P(B) = p \cdot (1-p) \cdot p = p^2 \cdot (1-p)$$

$$\text{entonces } \begin{cases} p = 0,65: P(B,N,B) = 0,65^2 \cdot 0,35 = 0,1479 \\ p = 0,73: P(B,N,B) = 0,73^2 \cdot 0,27 = 0,1439 \end{cases}$$

Resulta más probable ( $p = 0,65$ ), siendo más verosímil.

**FUNCIÓN DE VEROSIMILITUD DE LA MUESTRA (EMV).**- Sea  $(x_1, \dots, x_n)$  una muestra aleatoria de una población  $X$  con función de masa  $P_\theta$  (o función de densidad  $f_\theta$ ) donde  $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_n)$ .

El estimador de máxima verosimilitud de  $\theta$  es el formado por los valores  $(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_n)$  que maximizan lo que llamaremos *función de verosimilitud* de la muestra  $(x_1, \dots, x_n)$  obtenida:

$$L(\theta) = L(X; \theta) = L(x_1, \dots, x_n; \theta) = \begin{cases} P(x_1, \theta) \cdots P(x_n, \theta) & \text{caso discreto} \\ f_\theta(x_1) \cdots f_\theta(x_n) & \text{caso continuo} \end{cases}$$

Si consideramos la m.a.s.  $(x_1, x_2, x_3)$ , siendo las variables aleatorias  $x_i$  independientes, tomando los valores 0, 1, con distribución  $B(1, p)$ , la distribución de probabilidad asociada será:

$$\left. \begin{aligned} P(x_1, p) &= P(X = x_1) = p^{x_1} (1-p)^{1-x_1} \\ P(x_2, p) &= P(X = x_2) = p^{x_2} (1-p)^{1-x_2} \\ P(x_3, p) &= P(X = x_3) = p^{x_3} (1-p)^{1-x_3} \end{aligned} \right\} x_i = 1, 0 \text{ sea bola blanca o negra}$$

La función de verosimilitud será:

$$\begin{aligned} L(p) &= \prod_{i=1}^3 P(x_i, p) = p^{x_1} (1-p)^{1-x_1} \cdot p^{x_2} (1-p)^{1-x_2} \cdot p^{x_3} (1-p)^{1-x_3} = \\ &= p^{x_1+x_2+x_3} (1-p)^{3-(x_1+x_2+x_3)} \end{aligned}$$

En la muestra (B, N, B) el valor que toma la función de verosimilitud será:

$$L(p) = p^{1+0+1} (1-p)^{3-(1+0+1)} = p^2 \cdot (1-p)$$

**11.-** Un atleta olímpico de salto de altura se enfrenta a un listón de 2,3 metros. Su entrenador desea estudiar el comportamiento del saltador. Sabe que el número de saltos fallidos por hora es una variable aleatoria distribuida como una Poisson de parámetro  $\lambda$ .

- Calcular el estimador máximo verosímil del parámetro  $\lambda$ .
- Analizar sus propiedades.

Solución:

a)

En muchas ocasiones, es más práctico encontrar el estimador de máxima verosimilitud es considerar la función soporte o **log-verosimilitud**  $\ln L(\theta)$ , en lugar de la función de verosimilitud  $L(\theta)$ , ya que es más fácil de manejar y presenta los mismos máximos y mínimos.

Se despeja  $\hat{\theta} = (\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_n)$  de la ecuación:  $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} \Big|_{\theta=\hat{\theta}} = 0$  y se obtiene el estimador de máxima verosimilitud E.M.V ( $\hat{\theta}$ )

Sea la v.a.  $X =$  'número de saltos fallidos por hora'

$$\text{En la distribución de Poisson: } P(X = x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \quad \begin{cases} E(x) = \lambda \\ V(x) = \lambda \end{cases}$$

En una muestra aleatoria simple de tamaño  $n$ , la función de verosimilitud  $L(X, \lambda)$ :

$$L(\lambda) = L(X, \lambda) = \prod_{i=1}^n P(x_i, \lambda) = \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} e^{-\lambda} \dots \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-n\lambda}$$

$$L(X, \lambda) = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-n\lambda} \Rightarrow \ln L(X, \lambda) = \ln \left[ \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-n\lambda} \right] = \ln(\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}) - \ln\left(\prod_{i=1}^n x_i!\right) + \ln(e^{-n\lambda}) =$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!) - n\lambda$$

$$\ln L(X, \lambda) = \sum_{i=1}^n x_i \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!) - n\lambda$$

Para obtener el estimador de máxima verosimilitud EMV ( $\hat{\lambda}$ ), se deriva la expresión anterior respecto del parámetro para obtener, sustituyendo  $\lambda$  por  $\hat{\lambda}$

$$\frac{\partial \ln L(X, \lambda)}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda=\hat{\lambda}} = 0 = \sum_{i=1}^n x_i \frac{1}{\lambda} - n \Big|_{\lambda=\hat{\lambda}} = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$$

El estimador de máxima verosimilitud viene dado por la media muestral: EMV ( $\hat{\lambda}$ ) =  $\bar{x}$

b) Analizar las propiedades (Inssegadez, Consistencia, Eficiencia)

- Inssegadez

El estimador sería inssegado (centrado) si  $E(\hat{\lambda}) = \lambda$

$$E(\hat{\lambda}) = E\left[\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right] = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} (n\lambda) = \lambda$$

$$V(\hat{\lambda}) = V(\bar{x}) = V\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(x_i) = \frac{1}{n^2} (n\lambda) = \frac{\lambda}{n}$$

- Consistencia

Cuando no es posible emplear estimadores de máxima verosimilitud, el requisito mínimo deseable para un estimador es que sea consistente.

Un estimador  $\hat{\lambda}$  *consistente* es un estimador asintóticamente inssegado cuya varianza tiende a cero al aumentar el tamaño muestral.

El estimador  $\hat{\lambda}$  es *consistente* cuando  $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\lambda}) = \lambda$  y  $\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\lambda}) = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\lambda}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda = \lambda \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\lambda}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda}{n} = 0$$

El estimador  $\hat{\lambda}$  es consistente

- Eficiencia

Para que un estimador sea *eficiente* tiene que ser *centrado* y de *varianza mínima*. La varianza mínima se analiza en virtud de la acotación de Cramér-Rao:

$$V(\hat{\lambda}) \geq \frac{1}{E\left[\frac{\partial \ln L(X, \lambda)}{\partial \lambda}\right]^2} \quad \text{acotación de Cramér-Rao}$$

En el caso discreto de una m.a.s, la expresión anterior se puede simplificar:

$$V(\hat{\lambda}) \geq \frac{1}{n \cdot E\left[\frac{\partial \ln P(x; \theta)}{\partial \theta}\right]^2} \quad \text{acotación de Cramér-Rao}$$

Ahora bien,  $P(x, \lambda) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$

$$\ln P(x, \lambda) = \ln \left[ \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \right] = x \ln \lambda - \ln(x!) - \lambda$$

$$\frac{\partial \ln P(x, \lambda)}{\partial \lambda} = \frac{x}{\lambda} - 1 = \frac{x - \lambda}{\lambda}$$

$$E\left[\frac{\partial \ln P(x, \lambda)}{\partial \lambda}\right]^2 = E\left[\frac{x - \lambda}{\lambda}\right]^2 = \frac{1}{\lambda^2} E(x - \lambda)^2 = \frac{1}{\lambda^2} E(x - \bar{x})^2 = \frac{1}{\lambda^2} V(x) = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$$

En consecuencia,  $V(\hat{\lambda}) \geq \frac{1}{n \cdot \frac{1}{\lambda}} = \frac{\lambda}{n}$

El menor valor de la varianza del estimador será  $\frac{\lambda}{n}$

Se sabe que  $V(\hat{\lambda}) = V(\bar{x}) = \frac{\lambda}{n}$ , lo que muestra que el estimador empleado es *eficiente*.



**12.-** En una gran piscifactoría hay una proporción desconocida de peces de una especie A. Para obtener información sobre esta proporción, vamos a ir sacando peces al azar.

- a) Si la proporción de peces de la especie A es  $p$ , ¿cuál es la probabilidad de que el primer pez de la especie A sea el décimo que extraemos?
- b) Tres personas realizan, independientemente unas de otras, el proceso de sacar peces al azar hasta encontrarse con el primero de tipo A:
  - La primera persona obtiene el primer pez tipo A en la décima extracción
  - La segunda persona obtiene el primer pez tipo A en la decimoquinta extracción
  - La tercera persona obtiene el primer pez tipo A en la decimoctava extracción

Escribir la función de verosimilitud y obtener la estimación de máxima verosimilitud de la proporción  $p$ .

Solución:

El objetivo fundamental del ejercicio es estimar, por máxima verosimilitud, el parámetro  $p$  = "proporción de peces de la especie A".

a)  $P(\text{primer pez tipo A en la décima extracción}) = (1-p)^9 p$

b) La función de verosimilitud  $L(p) = P(\text{Resultados muestrales obtenidos})$

$$L(p) = P(\text{primer pez tipo A en la décima extracción y primer pez tipo A en la decimoquinta extracción y primer pez tipo A en la decimoctava extracción})$$

$$L(p) = \left( (1-p)^9 p \right) \left( (1-p)^{14} p \right) \left( (1-p)^{17} p \right) = (1-p)^{40} p^3$$

$$\log[L(p)] = \log\left( (1-p)^{40} p^3 \right) = \log(1-p)^{40} + \log p^3 = 40 \log(1-p) + 3 \log p$$

$$\frac{\log[L(p)]}{dp} = \frac{-40}{1-p} + \frac{3}{p} = 0 \quad \mapsto \quad \hat{p} = \frac{3}{43}$$

13.- Las personas de un país se clasifican según dos características: color de los ojos (claros u oscuros) y sexo (hombre o mujer). Las dos características son independientes.

- a) Obtenemos una muestra al azar de la población con los siguientes resultados:
- 200 mujeres con ojos claros
  - 150 hombres con ojos claros
  - 350 mujeres con ojos oscuros
  - 300 hombres con ojos oscuros

Obtener la estimación de máxima verosimilitud de  $p = P(\text{hombres})$  y  $q = P(\text{ojos oscuros})$

- b) Si tomamos 8 personas al azar de ese país, ¿cuál es la probabilidad de encontrar alguna mujer de ojos oscuros?. Y si la muestra que tomamos es de 200 personas, ¿cuál es la probabilidad de que haya más de 60 mujeres de ojos oscuros?

Solución:

a) Las probabilidades de los cuatro posibles resultados muestrales son:

- $P(\text{mujer con ojos claros}) = (1-p)q$
- $P(\text{hombre con ojos claros}) = pq$
- $P(\text{mujer con ojos oscuros}) = (1-p)(1-q)$
- $P(\text{hombre con ojos oscuros}) = p(1-q)$

La función de verosimilitud  $L(p, q) = P(\text{resultados muestrales obtenidos})$

$$L(p, q) = [(1-p)q]^{200} [pq]^{150} [(1-p)(1-q)]^{350} [p(1-q)]^{300} = p^{450} [1-p]^{550} q^{350} [1-q]^{650}$$

$$\log L(p, q) = \log [p^{450} (1-p)^{550} q^{350} (1-q)^{650}] = 450 \log p + 550 \log(1-p) + 350 \log q + 650 \log(1-q)$$

$$\frac{\partial \log L(p, q)}{\partial p} = \frac{450}{p} - \frac{550}{1-p} = 0 \quad \mapsto \quad \hat{p} = 0,45$$

$$\frac{\partial \log L(p, q)}{\partial q} = \frac{350}{q} - \frac{650}{1-q} = 0 \quad \mapsto \quad \hat{q} = 0,35$$

b) Se conoce que  $P(\text{mujer con ojos oscuros}) = (1-p)(1-q) = 0,24$

La variable aleatoria  $X = \text{"número de mujeres con ojos oscuros, entre 8"}$  sigue una distribución binomial  $B(n = 8, p = 0,24)$

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{8}{0} (0,24)^0 (0,76)^8 = 0,89$$

La variable  $Y = \text{"número de mujeres con ojos oscuros, entre 200"}$ ,  $Y \sim B(200, 0,24)$ , se aproxima por la distribución normal  $N(\mu = np = 48, \sigma = \sqrt{npq} = 6,04)$

$$P(Y > 60) = P\left(\frac{Y - 48}{6,04} > \frac{60 - 48}{6,04}\right) = P(Z > 1,99) = 0,0233$$

**14.-** Calcular el estimador máximo verosímil del parámetro 'a' de las funciones:

a)  $f(x, a) = a^2 e^{-ax}$  siendo  $x \geq 0$  en muestras aleatorias simples de tamaño n

b)  $f(x, a) = a e^{-ax}$  para  $x \geq 0$ ,  $a > 0$  en muestras aleatorias simples de tamaño 2

Solución:

a)  $f(x, a) = a^2 e^{-ax}$  donde  $x \geq 0$  en m.a.s. de tamaño n

La función de verosimilitud

$$L = L(x_1, x_2, \dots, x_n; a) = (a^2 e^{-ax_1}) \cdot (a^2 e^{-ax_2}) \dots (a^2 e^{-ax_n}) = a^{2n} e^{-a \sum_{i=1}^n x_i}$$

aplicando logaritmos neperianos:  $\ln L = \log (a^{2n} e^{-a \sum_{i=1}^n x_i}) = 2n \ln a - a \sum_{i=1}^n x_i$

derivando respecto de a e igualando a cero:

$$\frac{\partial(\ln L)}{\partial a} = \frac{2n}{a} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \Rightarrow \hat{a} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{2}{\bar{x}} \quad \hat{a} = \frac{2}{\bar{x}}$$

b) Sea  $f(x, a) = a e^{-ax}$  para  $x \geq 0$ ,  $a > 0$  en m.a.s. de tamaño 2

La función de verosimilitud

$$L = L(x_1, x_2; a) = (a e^{-ax_1}) \cdot (a e^{-ax_2}) = a^2 e^{-a(x_1+x_2)}$$

aplicando logaritmos neperianos:  $\ln L = \log (a^2 e^{-a(x_1+x_2)}) = 2 \ln a - a(x_1 + x_2)$

derivando respecto de 'a' e igualando a cero:

$$\frac{\partial(\ln L)}{\partial a} = \frac{2}{a} - (x_1 + x_2) = 0 \Rightarrow \hat{a} = \frac{2}{x_1 + x_2} = \frac{1}{\bar{x}}$$

15.- Sea la distribución  $N(\mu, \sigma)$ , con la media y varianza desconocidas. Calcular los estimadores máximo-verosímiles de  $\mu$  y  $\sigma^2$

Solución:

La función de verosimilitud es:

$$L(X; \mu, \sigma^2) = \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_1-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_2-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] \dots \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_n-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] =$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

tomando logaritmos neperianos, se tiene:

$$\ln [L(X; \mu, \sigma^2)] = \ln \left[ \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}$$

y derivando respecto de  $\mu$  y  $\sigma^2$  e igualando a cero:

$$\left[ \frac{\partial \ln L(X; \mu, \sigma^2)}{\partial \mu} \right]_{\mu=\hat{\mu}} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})}{\sigma^2} = 0 \quad \mapsto \quad \hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$$

$$\left[ \frac{\partial \ln L(X; \mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} \right]_{\sigma^2=\hat{\sigma}^2} = -\frac{n}{\hat{\sigma}^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{\hat{\sigma}^3} = 0 \quad \mapsto \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}$$

resolviendo el sistema resulta:  $\hat{\mu} = \bar{x}$  y  $\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} = \sigma_x^2$

La condición de máximo se verifica, pues:  $\left[ \frac{\partial^2 \ln L(X; \mu)}{\partial \mu^2} \right]_{\mu=\hat{\mu}} = -\frac{n}{\sigma^2} < 0$

Los estimadores máximo-verosímiles de  $\mu$  y  $\sigma^2$  son la media y la varianza muestrales.

**16.-** En una distribución  $N(\mu, \sigma)$ , se estima la media poblacional  $\mu$  mediante la media de una muestra aleatoria simple  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ . El estimador es insesgado y su varianza  $V(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$ . Demostrar que la media muestral es un estimador eficiente.

Solución:

La varianza de un estimador verifica siempre la *Cota de Cramér-Rao*:  $V(\hat{\theta}) \geq \text{CCR}$ .  
Un estimador es eficiente cuando  $V(\hat{\theta}) = \text{CCR}$

Para obtener la cota de Cramér-Rao se parte de la función de densidad poblacional:

$$\text{CCR} = \frac{1}{nE\left[\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu}\right]^2}$$

La función de densidad poblacional:  $f(x, \mu) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

tomando logaritmos neperianos, se tiene:

$$\ln f(x, \mu) = \ln\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\right) = -\ln \sigma - \frac{1}{2} \ln 2\pi - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$$

y derivando respecto a  $\mu$ :

$$\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2}[-2(x-\mu)] = \frac{x-\mu}{\sigma^2} \mapsto \left(\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu}\right)^2 = \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^4}$$

La esperanza matemática es:

$$E\left[\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu}\right]^2 = E\left[\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^4}\right] = \frac{\sigma^2}{\sigma^4} = \frac{1}{\sigma^2}$$

Sustituyendo el valor de la esperanza matemática en la expresión de la cota para estimadores insesgados:

$$\text{CCR} = \frac{1}{nE\left[\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu}\right]^2} = \frac{1}{n \frac{1}{\sigma^2}} = \frac{\sigma^2}{n}$$

La varianza del estimador coincide con la cota de Cramér-Rao, concluyendo que la media muestral es un estimador eficiente de la media poblacional en la distribución normal.

**17.-** A partir de una muestra aleatoria simple  $X$  de tamaño  $n$ , determinar la matriz de información de Fisher de una población con distribución  $N(\mu, \sigma)$ , respecto a los dos parámetros  $\mu$  y  $\sigma^2$ .

Solución:

La función de densidad poblacional:  $f(x, \mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

La función de verosimilitud es:

$$L(X; \mu, \sigma^2) = \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_1-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_2-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] \dots \left[ \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_n-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sigma^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

tomando logaritmos neperianos, se tiene:

$$\ln L(X; \mu, \sigma^2) = \ln \left[ \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sigma^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right] = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

derivando respecto de  $\mu$  y  $\sigma^2$

$$\frac{\partial \ln L(X; \mu, \sigma^2)}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) \quad \frac{\partial \ln L(X; \mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

y calculando las segundas derivadas:

$$\frac{\partial^2 \ln L(X; \mu, \sigma^2)}{\partial \mu^2} = -\frac{n}{\sigma^2} \quad \frac{\partial^2 \ln L(X; \mu, \sigma^2)}{\partial \mu \partial \sigma^2} = -\frac{1}{\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)$$

$$\frac{\partial^2 \ln L(X; \mu, \sigma^2)}{\partial (\sigma^2)^2} = \frac{n}{2\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^6} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

La matriz de información de Fisher:

$$I(\mu, \sigma^2) = -E \begin{bmatrix} -\frac{n}{\sigma^2} & -\frac{1}{\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) \\ -\frac{1}{\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) & \frac{n}{2\sigma^4} - \frac{1}{\sigma^6} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{n}{\sigma^2} & \frac{1}{\sigma^4} \sum_{i=1}^n E(x_i - \mu) \\ \frac{1}{\sigma^4} \sum_{i=1}^n E(x_i - \mu) & -\frac{n}{2\sigma^4} + \frac{1}{\sigma^6} \sum_{i=1}^n E(x_i - \mu)^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{n}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{n}{2\sigma^4} \end{bmatrix}$$

Adviértase que por ser  $x_i$  un elemento de una muestra aleatoria simple de una población normal  $N(\mu, \sigma)$ , se tiene que  $E(x_i - \mu) = 0$  y  $E(x_i - \mu)^2 = \sigma^2$

**18.-** En una distribución  $N(\mu, \sigma)$  se estima la media poblacional  $\mu$  en una muestra aleatoria simple de tamaño  $n$  ( $x_1, x_2, \dots, x_n$ ) por medio de la función muestral:

$$\hat{\mu} = \frac{\sum_{i=1}^n i x_i}{n}$$

Estúdiense la eficiencia del estimador.

Solución:

Un estimador es eficiente cuando  $V(\hat{\theta}) = \text{CCR}$

Para hallar la cota de Cramér-Rao se necesita saber en primer lugar si el estimador es insesgado o no, se calcula para ello la esperanza matemática:

$$\begin{aligned} E(\hat{\mu}) &= E\left[\frac{\sum_{i=1}^n i x_i}{n}\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(i x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n i E(x_i) = \frac{1}{n} [E(x_1) + 2E(x_2) + 3E(x_3) + \dots + nE(x_n)] = \\ &= \frac{1}{n} [\mu + 2\mu + 3\mu + \dots + n\mu] = \frac{\mu}{n} [1 + 2 + 3 + \dots + n] = \frac{\mu}{n} \frac{(n+1)n}{2} = \frac{(n+1)}{2} \mu \end{aligned}$$

$$E(\hat{\mu}) = \mu + b(\hat{\mu}) \quad \mapsto \quad \text{sesgo } b(\hat{\mu}) = E(\hat{\mu}) - \mu = \frac{n+1}{2} \mu - \mu = \frac{n-1}{2} \mu$$

La varianza del estimador:

$$\begin{aligned} V(\hat{\mu}) &= V\left[\frac{\sum_{i=1}^n i x_i}{n}\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(i x_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i^2 V(x_i) = \frac{1}{n^2} [1^2 V(x_1) + 2^2 V(x_2) + 3^2 V(x_3) + \dots + n^2 V(x_n)] = \\ &= \frac{1}{n^2} [1^2 \sigma^2 + 2^2 \sigma^2 + 3^2 \sigma^2 + \dots + n^2 \sigma^2] = \frac{\sigma^2}{n^2} [1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2] = \frac{\sigma^2}{n^2} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

$$V(\hat{\mu}) = \frac{\sigma^2 (n+1)(2n+1)}{6n}$$

$$\text{La cota de Cramér-Rao } \text{CCR} = \frac{[1 + b(\hat{\mu})]^2}{n E\left[\frac{\partial \ln L(x, \mu)}{\partial \mu}\right]^2}$$

$$[1 + b(\hat{\mu})]^2 = \left[1 + \frac{n-1}{2} \mu\right]^2 = \frac{(n+1)^2}{4}$$

La información de Fisher de la muestra  $I(\mu) = E \left[ \frac{\partial \ln L(X, \mu)}{\partial \mu} \right]^2 = n E \left[ \frac{\partial \ln L(x, \mu)}{\partial \mu} \right]^2$  se

obtiene a partir de la función de densidad poblacional  $f(x, \mu) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

tomando logaritmos neperianos, se tiene:

$$\ln f(x, \mu) = \ln \left( \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) = -\ln \sigma - \frac{1}{2} \ln 2\pi - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$$

y derivando respecto a  $\mu$ :

$$\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} [-2(x-\mu)] = \frac{x-\mu}{\sigma^2} \mapsto \left( \frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu} \right)^2 = \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^4}$$

La esperanza matemática es:

$$E \left[ \frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu} \right]^2 = E \left[ \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^4} \right] = \frac{\sigma^2}{\sigma^4} = \frac{1}{\sigma^2}$$

y atendiendo a la aditividad de esta medida  $I(\mu) = ni(\mu) = \frac{n}{\sigma^2}$

$$CCR = \frac{[1 + b(\hat{\mu})]^2}{n E \left[ \frac{\partial \ln L(x, \mu)}{\partial \mu} \right]^2} = \frac{(n+1)^2}{\frac{4}{\frac{n}{\sigma^2}}} = \frac{(n+1)^2 \sigma^2}{4n} \quad V(\hat{\mu}) = \frac{\sigma^2 (n+1)(2n+1)}{6n}$$

Al ser la varianza del estimador mayor que la cota de Cramér-Rao:

$$V(\hat{\mu}) = \frac{\sigma^2 (n+1)(2n+1)}{6n} > \frac{(n+1)^2 \sigma^2}{4n} = CCR$$

El estimador *no es eficiente*, siempre que  $n > 1$ .

**19.-** En la distribución  $B(m, p)$  se considera como estimador del parámetro  $p$  el estadístico  $\hat{p} = \frac{\bar{x}}{m}$ , siendo  $\bar{x}$  la media muestral en muestras aleatorias simples de tamaño  $n$ . Hallar la eficiencia del estimador.

Solución:

Un estimador es eficiente cuando  $V(\hat{\theta}) = CCR$  (*cota de Cramér-Rao*)

Se determina si el estimador es insesgado:  $E(\hat{p}) = E\left(\frac{\bar{x}}{m}\right) = \frac{mp}{m} = p$



Al coincidir la esperanza del estimador con el parámetro, el estimador es insesgado, por lo que la cota de Cramér-Rao es:

$$CCR = \frac{1}{nE\left[\frac{\partial \ln L(x, \mu)}{\partial \mu}\right]^2}$$

Para calcular el denominador de la cota se considera la función de cuantía de la distribución binomial:

$$f(x, p) = \binom{m}{x} p^x (1-p)^{m-x}$$

tomando logaritmo neperiano y derivando respecto al parámetro  $p$ , resulta:

$$\ln f(x, p) = \ln \binom{m}{x} + x \ln p + (m-x) \ln(1-p)$$

$$\frac{\partial \ln f(x, p)}{\partial p} = \frac{x}{p} - \frac{(m-x)}{1-p} = \frac{(1-p)x - p(m-x)}{p(1-p)} = \frac{x - mp}{p(1-p)}$$

$$\text{de donde, } E\left[\frac{\partial \ln f(x, p)}{\partial p}\right]^2 = E\left[\frac{x - mp}{p(1-p)}\right]^2 = \frac{E(x - mp)^2}{p^2(1-p)^2}$$

En una distribución binomial:  $E(\xi) = mp$ ,  $V(\xi) = E(\xi - mp)^2 = mp(1-p)$

$$\text{con lo que } E\left[\frac{\partial \ln f(x, p)}{\partial p}\right]^2 = \frac{E(x - mp)^2}{p^2(1-p)^2} = \frac{mp(1-p)}{p^2(1-p)^2} = \frac{m}{p(1-p)}$$

$$\text{La cota de Cramér-Rao: } CCR = \frac{1}{nE\left[\frac{\partial \ln L(x, \mu)}{\partial \mu}\right]^2} = \frac{1}{n \frac{m}{p(1-p)}} = \frac{p(1-p)}{nm}$$

De otra parte, La varianza del estimador:

$$V(\hat{p}) = V\left(\frac{\bar{x}}{m}\right) = \frac{1}{m^2} V(\bar{x}) = \frac{1}{m^2} \frac{mp(1-p)}{n} = \frac{p(1-p)}{mn}$$

Como la varianza del estimador coincide con la cota de Cramér-Rao es estadístico

$\hat{p} = \frac{\bar{x}}{m}$  es eficiente.

## CÁLCULO DE ESTIMADOR POR EL MÉTODO DE LOS MOMENTOS

20.- Sea una población definida por:  $P(X = -1) = \frac{1-\theta}{2}$ ,  $P(X = 0) = \frac{\theta+\lambda}{2}$ ,  
 $P(X = 1) = \frac{1-\lambda}{2}$ , donde  $0 < \theta < 1$ ,  $0 < \lambda < 1$

Estimar los parámetros  $\theta$  y  $\lambda$  por el método de los momentos, estudiando si son insesgados.

Solución:

**MÉTODO DE LOS MOMENTOS.-** El procedimiento consiste en igualar momentos poblacionales respecto al origen ( $\alpha_r$ ) a los correspondientes momentos muestrales respecto al origen ( $a_r$ ), formando así tantas ecuaciones como parámetros poblacionales se pretenden estimar:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 = E(X) = \mu \Rightarrow \hat{\alpha}_1 = a_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x} \\ \alpha_2 = E(X^2) \Rightarrow \hat{\alpha}_2 = a_2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} \\ \dots\dots\dots \\ \alpha_r = E(X^r) \Rightarrow \hat{\alpha}_r = a_r = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^r}{n} \end{array} \right.$$

Puesto que hay que estimar dos parámetros hay que calcular los dos primeros momentos.

$$\overbrace{\alpha_1 = \mu = E(X) = \sum_i x_i P(X=x_i)}^{\text{momentos poblacionales}} = (-1) \left( \frac{1-\theta}{2} \right) + (0) \left( \frac{\theta+\lambda}{2} \right) + (1) \left( \frac{1-\lambda}{2} \right) = \frac{\theta-\lambda}{2}$$

$$\alpha_2 = E(X^2) = \sum_i x_i^2 P(X=x_i) = (-1)^2 \left( \frac{1-\theta}{2} \right) + (0)^2 \left( \frac{\theta+\lambda}{2} \right) + (1)^2 \left( \frac{1-\lambda}{2} \right) = \frac{2-\theta-\lambda}{2}$$

$$\overbrace{a_1 = \bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} \quad a_2 = \frac{\sum_i x_i^2}{n}}^{\text{momentos muestrales}}$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 = a_1 \Rightarrow \frac{\theta-\lambda}{2} = \bar{x} \Rightarrow \theta - \lambda = 2\bar{x} \\ \alpha_2 = a_2 \Rightarrow \frac{2-\theta-\lambda}{2} = a_2 \Rightarrow -\theta - \lambda = 2a_2 - 2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \theta - \lambda = 2\bar{x} \\ -\theta - \lambda = 2a_2 - 2 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \hat{\lambda} = 1 - a_2 - \bar{x} \\ \hat{\theta} = 1 - a_2 + \bar{x} \end{array} \right.$$

- Un estimador  $\hat{\theta}$  es insesgado (o centrado) cuando se verifica  $E(\hat{\theta}) = \theta$

$$E(\hat{\theta}) = E(1 - a_2 + \bar{x}) = 1 - E(a_2) + E(\bar{x}) = 1 - \alpha_2 + \mu = 1 - \left(\frac{2 - \theta - \lambda}{2}\right) + \left(\frac{\theta - \lambda}{2}\right) = \theta$$

$$E(\hat{\lambda}) = E(1 - a_2 - \bar{x}) = 1 - E(a_2) - E(\bar{x}) = 1 - \alpha_2 - \mu = 1 - \left(\frac{2 - \theta - \lambda}{2}\right) - \left(\frac{\theta - \lambda}{2}\right) = \lambda$$

Los estimadores  $\theta$  y  $\lambda$  son insesgados.

## CÁLCULO DE ESTADÍSTICOS. FUNCIÓN DE DENSIDAD

21.- Una muestra aleatoria  $(X_1, \dots, X_n)$  de la población tiene como función de

$$\text{densidad } f_{\theta}(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & \text{si } x \in (0,1) \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases} \quad \theta > 0$$

- Hallar un estadístico suficiente
- Estimador de máxima verosimilitud de  $\theta$
- Estimador de  $\theta$  por el método de los momentos

Solución:

a)

Un estimador  $\hat{\theta}$  es suficiente cuando no da lugar a una pérdida de información. Es decir, cuando la información basada en  $\hat{\theta}$  es tan buena como la que hiciera uso de toda la muestra.

Para identificar estadísticos suficientes se utiliza el teorema de factorización, que dice que dada una muestra aleatoria  $(x_1, \dots, x_n)$  de una población  $X$  con función de masa

$P_{\theta}$  (o función de densidad  $f_{\theta}$ ) un estadístico  $\hat{\theta}$  es suficiente para  $\theta$  si y sólo si:

$$\begin{cases} P_{\theta}(x_1, \dots, x_n) = g[\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n), \theta] \cdot h(x_1, \dots, x_n) & \text{caso discreto} \\ f_{\theta}(x_1, \dots, x_n) = g[\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n), \theta] \cdot h(x_1, \dots, x_n) & \text{caso continuo} \end{cases}$$

Para encontrar un estadístico suficiente  $\hat{\theta}$  hay que factorizar la función de verosimilitud de la forma:  $L(\theta) = g(\hat{\theta}, \theta) \cdot h(x_1, \dots, x_n)$

$$L(\theta) = f_{\theta}(x_1) f_{\theta}(x_2) \dots f_{\theta}(x_n) = (\theta x_1^{\theta-1})(\theta x_2^{\theta-1}) \dots (\theta x_n^{\theta-1}) = \theta^n (x_1 \dots x_n)^{\theta-1}$$

Por tanto,  $\hat{\theta} = x_1, \dots, x_n$  es un estadístico suficiente.

$$b) L(\theta) = \theta^n (x_1 \cdots x_n)^{\theta-1}$$

$$\ln L(\theta) = \ln \left[ \theta^n (x_1 \cdots x_n)^{\theta-1} \right] = \ln \theta^n + \ln \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1} = \ln \theta^n + \sum_{i=1}^n \ln(x_i^{\theta-1})$$

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + [\theta-1] \sum_{i=1}^n \ln(x_i) \Rightarrow \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0 \mapsto \hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$$

c) Se plantea la ecuación  $E[X] = \bar{x}$

$$\bar{x} = E(X) = \int_0^1 x f_{\theta}(x) dx = \int_0^1 x \theta x^{\theta-1} dx = \int_0^1 \theta x^{\theta} dx = \theta \left[ \frac{x^{\theta+1}}{\theta+1} \right]_0^1 = \frac{\theta}{\theta+1}$$

$$\bar{x} (\theta+1) = \theta \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{\bar{x}}{1-\bar{x}}$$

22.- Una muestra aleatoria  $(X_1, \dots, X_n)$  de la población tiene como función de densidad

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} e^{-x+\theta} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

a) Hallar un estimador por el método de los momentos de  $\theta$

b) Estudiar si el estimador encontrado en el apartado anterior es insesgado para estimar el parámetro  $\theta$

Solución:

a) Se plantea la ecuación:  $E[X] = \bar{x}$

$$\bar{x} = E[X] = \int_0^{\infty} x f_{\theta}(x) dx = \overbrace{\int_0^{\infty} x e^{-x+\theta} dx}^{\text{integración por partes}} = \theta + 1 \Rightarrow \hat{\theta} = \bar{x} - 1$$

b) Un estimador es insesgado o centrado cuando su valor probable coincide con el valor del parámetro a estimar. Es decir,  $E[\hat{\theta}] = \theta$

$$E[\hat{\theta}] = E(\bar{x} - 1) = E(\bar{x}) - 1 = (\theta + 1) - 1 = \theta$$

 Integración por partes:

$$\int \underbrace{x}_{u} \underbrace{e^{-x+\theta}}_{dv} dx = \underbrace{x}_{u} \underbrace{(-e^{-x+\theta})}_{v} - \int \underbrace{-e^{-x+\theta}}_{v} \underbrace{dx}_{du} = -x e^{-x+\theta} - e^{-x+\theta} = -(1+x) e^{-x+\theta} = -e^{-\theta} \left( \frac{1+x}{e^x} \right)$$

$$\int_{\theta}^{\infty} x e^{-x+\theta} dx = -e^{-\theta} \left( \frac{1+x}{e^x} \right)_{\theta}^{\infty} = 1+\theta$$

**23.-** Una muestra aleatoria  $(X_1, \dots, X_n)$  de la población tiene como función de

$$\text{densidad } f_{\theta}(x) = \begin{cases} \theta^2 x e^{-\theta x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Hallar el estimador de máxima verosimilitud de  $\theta$

Solución:

La función de verosimilitud  $L(\theta)$

$$L(\theta) = f_{\theta}(x_1) f_{\theta}(x_2) \dots f_{\theta}(x_n) = \left[ \theta^2 x_1 e^{-\theta x_1} \right] \left[ \theta^2 x_2 e^{-\theta x_2} \right] \dots \left[ \theta^2 x_n e^{-\theta x_n} \right] =$$

$$= \theta^{2n} (x_1 \dots x_n) e^{-(\theta x_1 + \theta x_2 + \dots + \theta x_n)} = \theta^{2n} (x_1 \dots x_n) e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}$$

$$L(\theta) = \theta^{2n} (x_1 \dots x_n) e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i} \Rightarrow \ln L(\theta) = \ln \left[ \theta^{2n} (x_1 \dots x_n) e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i} \right]$$

$$\ln L(\theta) = (2n) \ln \theta + \ln \prod_{i=1}^n x_i - \theta \sum_{i=1}^n x_i \Rightarrow \ln L(\theta) = (2n) \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i - \theta \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n x_i}$$

**24.-** El coseno  $X$  del ángulo con el que se emiten los electrones en un proceso radioactivo es una variable aleatoria con función de densidad

$$f_{\theta}(x) = \begin{cases} (1+\theta x)/2 & -1 \leq x \leq 1, \quad -1 \leq \theta \leq 1 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Consideremos una muestra aleatoria  $(X_1, \dots, X_n)$  de esta variable aleatoria

- Obtener el estimador  $\theta$  por el método de los momentos
- Calcular la varianza de este estimador y demostrar que es consistente

Solución:

- Se plantea la ecuación  $E[X] = \bar{x}$

$$\bar{x} = E[X] = \int_{-1}^1 x \frac{1+\theta x}{2} dx = \left[ \frac{x^2}{2} + \frac{\theta x^3}{6} \right]_{-1}^1 = \frac{\theta}{3} \Rightarrow \hat{\theta} = 3\bar{x}$$

$$b) V(\hat{\theta}) = V(3\bar{x}) = 9V(\bar{x}) = 9 \frac{V(X)}{n} = \frac{9}{n} V(X)$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_{-1}^1 x^2 \frac{1+\theta x}{2} dx - \left[ \frac{\theta}{3} \right]^2 = \left[ \frac{x^3}{6} + \frac{\theta x^4}{8} \right]_{-1}^1 - \left[ \frac{\theta}{3} \right]^2 = \frac{3-\theta^2}{9}$$

$$\text{de donde, } V(\hat{\theta}) = \frac{9}{n} V(X) = \frac{9}{n} \left[ \frac{3-\theta^2}{9} \right] = \frac{3-\theta^2}{n}$$

Para probar que  $\hat{\theta}$  es consistente para estimar  $\theta$  es suficiente probar  $\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta \\ \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}) = 0 \end{cases}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \lim_{n \rightarrow \infty} E(3\bar{x}) = \lim_{n \rightarrow \infty} 3E(\bar{x}) = 3E(X) = 3 \frac{\theta}{3} = \theta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}) = \lim_{n \rightarrow \infty} V(3\bar{x}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3-\theta^2}{n} = 0$$

Por tanto, queda probado que  $\hat{\theta}$  es consistente para estimar  $\theta$

**25.-** En un estacionamiento el número de veces que se abre la barrera en un intervalo de 10 minutos, para que pasen vehículos en un sector de seguridad, se considera una variable aleatoria con distribución de Poisson de parámetro  $\lambda$  desconocido.

a) En una muestra aleatoria de 8 intervalos de 10 minutos cada uno, elegidos de forma independiente, se registra para cada intervalo el valor que toma la variable en estudio.

3	5	8	7	4	5	6	2
---	---	---	---	---	---	---	---

Encontrar la estimación máximo verosímil de  $\lambda$

b) Sea  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  una muestra aleatoria de tamaño  $n$  que sigue una distribución de Poisson. Si  $\hat{\lambda}_1 = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$ ,  $\hat{\lambda}_2 = \frac{x_1 + 3x_n}{4}$  son estimadores. Determinar el mejor estimador del parámetro  $\lambda$

Solución:

a)  $X =$  "número de veces que se abre la barrera en un intervalo de 10 minutos",  
 $X \sim P(\lambda)$

$$P(X, \lambda) = \begin{cases} \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

La función de verosimilitud  $L(\lambda)$ :

$$L(\lambda) = L(X, \lambda) = \prod_{i=1}^n P(x_i, \lambda) = \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} e^{-\lambda} \dots \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-n\lambda}$$

$$\ln L(X, \lambda) = \ln \left( \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-n\lambda} \right) = \ln(\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}) - \ln \left( \prod_{i=1}^n x_i! \right) + \ln(e^{-n\lambda}) = \sum_{i=1}^n x_i \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!) - n\lambda$$

$$\ln L(X, \lambda) = \sum_{i=1}^n x_i \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!) - n\lambda$$

Para obtener el estimador de máxima verosimilitud  $EMV(\hat{\lambda})$ , se deriva la expresión anterior respecto del parámetro para obtener, sustituyendo  $\lambda$  por  $\hat{\lambda}$

$$\left. \frac{\partial \ln L(X, \lambda)}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=\hat{\lambda}} = 0 = \sum_{i=1}^n x_i \frac{1}{\lambda} - n \Big|_{\lambda=\hat{\lambda}} = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$$

El estimador de máxima verosimilitud viene dado por la media muestral:  $EMV(\hat{\lambda}) = \bar{x}$

Utilizando la muestra aleatoria de ocho intervalos de 10 minutos, se obtiene el estimador máximo verosímil:

$$\hat{\lambda} = \frac{3+5+8+7+4+5+6+2}{8} = 5$$

En consecuencia, en una muestra aleatoria de ocho intervalos de 10 minutos cada uno, elegidos de forma independiente, la estimación máxima verosímil corresponde a que la barrera se abre 5 veces.

b) Se analizan si los estimadores son o no insesgados, esto es, si la esperanza del estimador coincide con el parámetro a estimar.

$$E(\hat{\lambda}_1) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{n\lambda}{n} = \lambda$$

$$E(\hat{\lambda}_2) = E\left(\frac{x_1 + 3x_n}{4}\right) = \frac{1}{4} [E(x_1) + 3E(x_n)] = \frac{\lambda + 3\lambda}{4} = \lambda$$

Ambos estimadores son insesgados. La varianza de cada estimador:

$$V(\hat{\lambda}_1) = V\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(x_i) = \frac{n\lambda}{n^2} = \frac{\lambda}{n}$$

$$V(\hat{\lambda}_2) = V\left(\frac{x_1 + 3x_n}{4}\right) = \frac{1}{16} [V(x_1) + 9V(x_n)] = \frac{\lambda + 9\lambda}{16} = \frac{10\lambda}{16} = \frac{5\lambda}{8}$$

En conclusión, la efectividad de los estimadores depende del tamaño de la muestra:

Si la muestra es igual a 1 ( $n = 1$ ) el estimador más eficiente es  $\hat{\lambda}_2$

Si la muestra es mayor que 1 ( $n > 1$ ) el estimador más eficiente es  $\hat{\lambda}_1$

**26.-** Sea  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  una muestra aleatoria de tamaño  $n$ , distribuida según  $f(x, \theta)$  con  $\theta$  desconocido, donde  $X$  representa el tiempo máximo necesario para determinar un proceso en segundos:

$$f(X, \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta & 0 \leq x \leq 1; \theta > -1 \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

- a) Determinar el estimador máximo verosímil de  $\theta$
- b) Determinar la estimación máximo verosímil de  $\theta$  en una muestra aleatoria simple constituida por los datos: 0,7 ; 0,9 ; 0,6 ; 0,8 ; 0,9 ; 0,7 ; 0,9.

Estimar la probabilidad del tiempo máximo necesario para terminar un proceso, que no exceda de 0,25 segundos ni supere los 0,75 segundos.

- c) Determinar el estimador máximo verosímil de: (a)  $\theta + 1$     (b)  $\frac{2\theta + 1}{\theta - 1}$

Solución:

a) La función de verosimilitud  $L(\theta) = L(X, \theta) = \prod_{i=0}^n f(x_i, \theta)$

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = [(\theta + 1)x_1^\theta] [(\theta + 1)x_2^\theta] \dots [(\theta + 1)x_n^\theta] = (\theta + 1)^n \prod_{i=0}^n x_i^\theta$$

Calculando el logaritmo natural de  $L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)$ :

$$\ln [L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)] = \ln \left( (\theta + 1)^n \prod_{i=0}^n x_i^\theta \right) = \ln(\theta + 1)^n + \ln \left( \prod_{i=0}^n x_i^\theta \right)$$

$$\ln [L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)] = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=0}^n \ln x_i$$

Para obtener el estimador de máxima verosimilitud  $EMV(\hat{\theta})$ , se deriva la expresión anterior respecto del parámetro para obtener, sustituyendo  $\theta$  por  $\hat{\theta}$

$$\frac{\partial \ln [L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta)]}{\partial \theta} \Big|_{\theta = \hat{\theta}} = \frac{n}{\hat{\theta} + 1} + \sum_{i=0}^n \ln x_i = 0 \quad \mapsto \quad \frac{n}{\hat{\theta} + 1} = - \sum_{i=0}^n \ln x_i$$



$$\hat{\theta} = \text{EMV}(\theta) = -\frac{n}{\sum_{i=0}^n \ln x_i} - 1$$

b) El estimador máximo verosímil de  $\theta$  con los datos de la muestra:

$$\hat{\theta} = -\frac{8}{\ln 0,7 + \ln 0,9 + \ln 0,6 + \ln 0,8 + \ln 0,9 + \ln 0,7 + \ln 0,9 + \ln 0,8} - 1 = 4,027 - 1 = 3,027$$

El estimador máximo verosímil  $\text{EMV}(\theta) = \hat{\theta} = 3,027$

De otra parte,

$$P(0,25 \leq X \leq 0,75) = \int_{0,25}^{0,75} f(X, \hat{\theta}) dx = \int_{0,25}^{0,75} (\hat{\theta} + 1) x^{\hat{\theta}} dx = (\hat{\theta} + 1) \frac{x^{\hat{\theta}+1}}{(\hat{\theta} + 1)} \Big|_{0,25}^{0,75} = x^{\hat{\theta}+1} \Big|_{0,25}^{0,75}$$

$$P(0,25 \leq X \leq 0,75) = 0,75^{4,027} - 0,25^{4,027} = 0,31$$

La probabilidad del tiempo máximo necesario para terminar el proceso (entre 0,25 y 0,75 segundos) es 0,31

c) El estimador máximo verosímil de  $\theta + 1$  y  $\frac{2\theta + 1}{\theta - 1}$

$$\text{EMV}[\theta + 1] = \text{EMV}[\theta] + 1 = \hat{\theta} + 1 = 3,027 + 1 = 4,027$$

$$\text{EMV}\left(\frac{2\theta + 1}{\theta - 1}\right) = \frac{2 \text{EMV}(\theta) + 1}{\text{EMV}(\theta) - 1} = \frac{2\hat{\theta} + 1}{\hat{\theta} - 1} = \frac{2 \times 3,027 + 1}{3,027 - 1} = 2,493$$

