

PORTAL ESTADÍSTICA APLICADA

Normal t Student Chi-cuadrado Integración Distribuciones Probabilidad

Intervalos Contrastes Contraste Regresión Mercado Bursátil Ejercicios Distribuciones Estimadores

MÉTODOS DE INTEGRACIÓN Matrices, Determinantes

Inmediatas Partes Trigonométricas Hermite racionales Irracionales

Paramétrica Gamma Beta Hiperbólicas

INDICE

	<u>Páginas</u>
Integración inmediata	2
Integración por partes	4
Integración funciones racionales	8
Integración funciones irracionales	11
Integración método de Hermite	17
Integración funciones trigonométricas	21
Integración funciones hiperbólicas	25
Integración función Gamma	28
Integración función Beta	30
Integración paramétrica	34

INTEGRALES INMEDIATAS



Calcular $\int (3x + 4)^2 dx$

Si $u = 3x + 4 \mapsto du = 3dx \mapsto dx = 1/3 du$

$$\int (3x + 4)^2 dx = \frac{1}{3} \int u^2 du = \frac{1}{9} u^3 + C = \frac{1}{9} (3x + 4)^3 + C$$



Calcular $\int \frac{x}{x^2 - 1} dx$

$$\int \frac{x}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 - 1} dx = \frac{1}{2} L(x^2 - 1) + C = L\sqrt{x^2 - 1} + C$$



Calcular $\int \frac{\text{sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$

$$d \cos \sqrt{x} = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \text{sen}\sqrt{x} dx \mapsto -2 d \cos \sqrt{x} = \frac{\text{sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$$

$$\int \frac{\text{sen}\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = -2 \int d \cos \sqrt{x} = -2 \cos \sqrt{x} + C$$



Calcular $\int \frac{dx}{9 + x^2}$

$$\int \frac{dx}{9 + x^2} = \frac{1}{9} \int \frac{dx}{1 + (x/3)^2} = \frac{1}{3} \int \frac{(1/3) dx}{1 + (x/3)^2} = \frac{1}{3} \text{arctg} \frac{x}{3} + C$$



Calcular $\int \frac{Lx}{x} dx$

Si $u = Lx \mapsto du = \frac{dx}{x}$

$$\int \frac{Lx}{x} dx = \int u du = \frac{u^2}{2} + C = \frac{(Lx)^2}{2} + C$$



Calcular $\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{1-(x/2)^2}} = \int \frac{(1/2) dx}{\sqrt{1-(x/2)^2}} = \text{arc tg } \frac{x}{2} + C$$



Calcular $\int \frac{e^{1/x^2} dx}{x^3}$

$$u = \frac{1}{x^2} \quad \mapsto \quad du = -\frac{2}{x^3} dx \quad \mapsto \quad \frac{dx}{x^3} = -\frac{1}{2} du$$

$$\int \frac{e^{1/x^2} dx}{x^3} = -\frac{1}{2} \int e^u du = -\frac{1}{2} e^u + C = -\frac{1}{2} e^{1/x^2} + C$$

INTEGRACIÓN POR PARTES



Calcular $\int \cos x e^{-x} dx$

$$u = e^{-x} \Rightarrow du = -e^{-x} dx$$

$$dv = \cos x dx \Rightarrow v = \text{sen} x$$

$$\int \cos x e^{-x} dx = \text{sen} x e^{-x} + \int \text{sen} x e^{-x} dx \quad \bullet$$

$$\left. \begin{array}{l} u = e^{-x} \Rightarrow du = -e^{-x} dx \\ dv = \text{sen} x dx \Rightarrow v = -\cos x \end{array} \right\} \int \text{sen} x e^{-x} dx = -\cos x e^{-x} - \int \cos x e^{-x} dx$$

$$\bullet \int \cos x e^{-x} dx = \text{sen} x e^{-x} - \cos x e^{-x} - \int \cos x e^{-x} dx$$

$$2 \int \cos x e^{-x} dx = \text{sen} x e^{-x} - \cos x e^{-x} \quad \mapsto \quad \int \cos x e^{-x} dx = \frac{e^{-x}}{2} (\text{sen} x - \cos x) + C$$



Calcular $\int Lx dx$

$$\left. \begin{array}{l} u = Lx \Rightarrow du = \frac{dx}{x} \\ dv = dx \Rightarrow v = x \end{array} \right\} \int Lx dx = x Lx - \int \frac{dx}{x} = x Lx - x + C$$



Calcular $\int L(a^2 + x^2) dx$

$$\left. \begin{array}{l} u = L(a^2 + x^2) \Rightarrow du = \frac{2x}{a^2 + x^2} dx \\ dv = dx \Rightarrow v = x \end{array} \right\} \int L(a^2 + x^2) dx = x L(a^2 + x^2) - \int \frac{2x^2}{a^2 + x^2} dx \quad \oplus$$

$$\int \frac{2x^2}{a^2 + x^2} dx = \int \left(2 - \frac{2a^2}{a^2 + x^2} \right) dx = 2x - 2 \int \frac{a^2}{a^2 + x^2} dx = 2x - 2 \int \frac{dx}{1 + (x/a)^2} = 2x - 2a \text{ arctg} \frac{x}{a}$$

$$\oplus \int L(a^2 + x^2) dx = x L(a^2 + x^2) - 2x + 2a \text{ arctg} \frac{x}{a} + C$$



Calcular $\int \operatorname{arctg} x \, dx$

$$\left. \begin{array}{l} u = \operatorname{arctg} x \Rightarrow du = \frac{dx}{1+x^2} \\ v = dx \Rightarrow v = x \end{array} \right\} \int \operatorname{arctg} x \, dx = x \operatorname{arctg} x - \int \frac{x \, dx}{1+x^2} = x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} L(1+x^2) + C$$



Calcular $\int \frac{x \operatorname{arcsen} x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} dx$

$$\left. \begin{array}{l} u = \operatorname{arcsen} x \Rightarrow du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} \\ dv = x(1-x^2)^{-3/2} dx \Rightarrow v = (1-x^2)^{-1/2} \end{array} \right\}$$

$$\int \frac{x \operatorname{arcsen} x}{\sqrt{(1-x^2)^3}} dx = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \operatorname{arcsen} x - \int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{\operatorname{arcsen} x}{\sqrt{1-x^2}} - \operatorname{ArgTh} x + C$$

$$\text{Adviértase } \operatorname{ArgTh} x = \frac{1}{2} L \frac{1+x}{1-x} = L \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$$



Calcular $\int \frac{Lx}{(1-x)^{3/2}} dx$

$$\left. \begin{array}{l} u = Lx \Rightarrow du = \frac{dx}{x} \\ dv = (1-x)^{-3/2} dx \Rightarrow v = 2(1-x)^{-1/2} \end{array} \right\} \int \frac{Lx}{(1-x)^{3/2}} dx = \frac{2Lx}{\sqrt{1-x}} - 2 \int \frac{dx}{x \sqrt{1-x}} \oplus$$

$$\left. \begin{array}{l} 1-x = u^2 \quad dx = -2u \, du \\ x = 1-u^2 \end{array} \right\} \int \frac{dx}{x \sqrt{1-x}} = -2 \int \frac{du}{1-u^2} = -2 \operatorname{ArgTh} \sqrt{1-x} = -L \left| \frac{1+\sqrt{1-x}}{1-\sqrt{1-x}} \right|$$

$$\oplus \int \frac{Lx}{(1-x)^{3/2}} dx = \frac{2Lx}{\sqrt{1-x}} - 2 \int \frac{dx}{x \sqrt{1-x}} = \frac{2Lx}{\sqrt{1-x}} + 2L \left| \frac{1+\sqrt{1-x}}{1-\sqrt{1-x}} \right| + C$$



Calcular $\int \operatorname{arc\,cotg} x \, dx$

$$u = \operatorname{arc\,cotg} x \Rightarrow du = \frac{-dx}{1+x^2}$$

$$dv = dx \Rightarrow v = x$$

$$\int \operatorname{arc\,cotg} x \, dx = x \operatorname{arc\,cotg} x + \int \frac{x \, dx}{1+x^2} = x \operatorname{arc\,cotg} x + \frac{1}{2} L(1+x^2) + C$$



Calcular $\int x \sqrt{4-5x} \, dx$

$$u = x \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \sqrt{4-5x} \, dx \Rightarrow v = \int \sqrt{4-5x} \, dx = -\frac{2}{15}(4-5x)^{3/2}$$

$$\int \sqrt{4-5x} \, dx = \int (4-5x)^{1/2} \, dx = \left\{ \begin{array}{l} t = 4-5x \\ dt = -5dx \end{array} \right\} = \frac{-1}{5} \int t^{1/2} \, dt = -\frac{2}{15}(4-5x)^{3/2}$$

$$\int x \sqrt{4-5x} \, dx = -\frac{2}{15} x (4-5x)^{3/2} + \frac{2}{15} \int (4-5x)^{3/2} \, dx \oplus$$

$$\int (4-5x)^{3/2} \, dx = \left\{ \begin{array}{l} t = 4-5x \\ dt = -5dx \end{array} \right\} = \frac{-1}{5} \int t^{3/2} \, dt = -\frac{2}{25}(4-5x)^{5/2}$$

$$\oplus \int x \sqrt{4-5x} \, dx = -\frac{2}{15} x (4-5x)^{3/2} - \frac{4}{375}(4-5x)^{5/2} + C$$



Calcular $\int x^3 e^{-x^2} \, dx$

$$u = x^2 \Rightarrow du = 2x \, dx$$

$$dv = x e^{-x^2} \, dx \Rightarrow v = -\frac{1}{2} e^{-x^2}$$

$$\int x^3 e^{-x^2} \, dx = -\frac{1}{2} x^2 e^{-x^2} + \int x e^{-x^2} \, dx = -\frac{1}{2} x^2 e^{-x^2} - \frac{1}{2} e^{-x^2} + C$$



Calcular $\int e^{2x} \operatorname{sen} x \, dx$

$$\left. \begin{array}{l} u = e^{2x} \Rightarrow du = 2e^{2x} \, dx \\ dv = \operatorname{sen} x \, dx \Rightarrow v = -\operatorname{cos} x \end{array} \right\} \int e^{2x} \operatorname{sen} x \, dx = -e^{2x} \operatorname{cos} x + 2 \int e^{2x} \operatorname{cos} x \, dx \quad \oplus$$

$$\left. \begin{array}{l} u = e^{2x} \Rightarrow du = 2e^{2x} \, dx \\ dv = \operatorname{cos} x \, dx \Rightarrow v = \operatorname{sen} x \end{array} \right\} \int e^{2x} \operatorname{cos} x \, dx = e^{2x} \operatorname{sen} x - 2 \int e^{2x} \operatorname{sen} x \, dx$$

$$\oplus \int e^{2x} \operatorname{sen} x \, dx = -e^{2x} \operatorname{cos} x + 2 e^{2x} \operatorname{sen} x - 4 \int e^{2x} \operatorname{sen} x \, dx$$

$$5 \int e^{2x} \operatorname{sen} x \, dx = -e^{2x} \operatorname{cos} x + 2 e^{2x} \operatorname{sen} x \quad \mapsto \int e^{2x} \operatorname{sen} x \, dx = \frac{e^{2x}}{5} (2 \operatorname{sen} x - \operatorname{cos} x) + C$$

CÁLCULO INTEGRAL: FUNCIONES RACIONALES



Calcular $\int \frac{x+1}{x^2-4x+8} dx$

El numerador es de un grado menos que el denominador, se trata de un logaritmo

$$\int \frac{x+1}{x^2-4x+8} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+2+4-4}{x^2-4x+8} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x-4}{x^2-4x+8} dx + \frac{1}{2} \int \frac{2x+6}{x^2-4x+8} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{2x-4}{x^2-4x+8} dx + 3 \int \frac{dx}{x^2-4x+8} = \frac{1}{2} L(x^2-4x+8) + 3I \quad \bullet$$

$$I = \int \frac{dx}{x^2-4x+8} = \int \frac{dx}{x^2-4x+8} = \int \frac{dx}{4+(x-2)^2} = \frac{1}{4} \int \frac{dx}{1+[(x-2)/2]^2} =$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{1/2 dx}{1+[(x-2)/2]^2} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{2}$$

- Resulta $\int \frac{x+1}{x^2-4x+8} dx = \frac{1}{2} L(x^2-4x+8) + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{2} + C$



Calcular $\int \frac{x^2}{x^2+2x+1} dx$

Numerador y denominador son del mismo grado, se puede dividir la función:

$$\int \frac{x^2}{x^2+2x+1} dx = \int \left[1 - \frac{2x+1}{x^2+2x+1} \right] dx = x - \int \frac{2x+1}{x^2+2x+1} dx \quad \bullet$$

La integral $\int \frac{2x+1}{x^2+2x+1} dx = \int \frac{2x+2}{x^2+2x+1} dx - \int \frac{dx}{x^2+2x+1} =$

$$= L(x^2+2x+1) - \int (x+1)^{-2} dx = L(x^2+2x+1) - \frac{(x+1)^{-1}}{-1}$$

- En definitiva: $\int \frac{x^2}{x^2+2x+1} dx = x - L(x^2+2x+1) - \frac{1}{x+1} + C$



Calcular $\int \frac{x^3 + x^2 - x + 1}{x^2 + 1} dx$

Se divide la función subintegral al se el numerador de mayor grado que el denominador

$$\int \frac{x^3 + x^2 - x + 1}{x^2 + 1} dx = \int \left(x + 2 - \frac{2x + 1}{x^2 + 1} \right) dx = \int (x + 2) dx - \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx - \int \frac{dx}{x^2 + 1} =$$

$$= \frac{x^2}{2} + 2x - L(x^2 + 1) - \arctg x + C$$



Calcular $\int \frac{x^4}{(x^2 + 1)^2} dx$

a) Se trata de una función racional, que queda:

$$\int \frac{x^4}{(x^2 + 1)^2} dx = \int \left(1 - \frac{2x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} \right) dx = x - \int \frac{2x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} dx \quad \bullet$$

Aplicando el método de Hermite:

$$\frac{2x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} = \frac{Ax + B}{x^2 + 1} + \frac{d}{dx} \left[\frac{Cx + D}{x^2 + 1} \right]$$

Derivando e identificando coeficientes, resulta:

$$2x^2 + 1 = Ax^3 + (B - C)x^2 + (A - 2D)x + (B + C)$$

$$\begin{cases} A = 0 \\ B - C = 2 \\ A - 2D = 0 \\ B + C = 1 \end{cases} \mapsto \begin{cases} A = 0 & D = 0 \\ B - C = 2 \\ B + C = 1 \end{cases} \mapsto \begin{cases} A = 0 & D = 0 \\ B = \frac{3}{2} & C = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\int \frac{2x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x^2 + 1} - \frac{x}{2(x^2 + 1)} = -\frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{3}{2} \arctg x$$

$$\bullet \int \frac{x^4}{(x^2 + 1)^2} dx = x - \int \frac{2x^2 + 1}{(x^2 + 1)^2} dx = \boxed{x + \frac{x}{2(x^2 + 1)} - \frac{3}{2} \arctg x + C}$$

b) $\int \frac{x^4}{(x^2 + 1)^2} dx$ se puede resolver mediante integración por partes:

$$u = x^3 \quad du = 3x^2 dx$$

$$dv = \frac{x}{(x^2+1)^2} dx \quad v = \int \frac{x}{(x^2+1)^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{dz}{z^2} = -\frac{1}{2(x^2+1)}$$

$$\int \frac{x^4}{(x^2+1)^2} dx = \frac{-x^3}{2(x^2+1)} + \frac{3}{2} \int \frac{x^2 dx}{x^2+1} = \frac{-x^3}{2(x^2+1)} + \frac{3}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx =$$

$$= \frac{-x^3}{2(x^2+1)} + \frac{3}{2}x - \frac{3}{2} \int \frac{1}{1+x^2} dx = \boxed{\frac{-x^3}{2(x^2+1)} + \frac{3}{2}x - \frac{3}{2} \arctg x + C}$$

Obsérvese, $\frac{-x^3}{2(x^2+1)} + \frac{3}{2}x = \frac{2x^3+3x}{2(x^2+1)} = x + \frac{x}{2(x^2+1)}$



Calcular $\int \frac{x^4}{x^4-1} dx$

Se divide la función subintegral $\frac{x^4}{x^4-1}$:

$$\int \frac{x^4}{x^4-1} dx = \int \left(1 + \frac{1}{x^4-1}\right) dx = \int dx + \int \frac{1}{x^4-1} dx = x + \int \frac{1}{x^4-1} dx \quad \bullet$$

Para calcular $\int \frac{1}{x^4-1} dx$ se descompone el polinomio (x^4-1) por Ruffini:

$$\frac{1}{x^4-1} = \frac{1}{(x-1)(x+1)(x^2+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

Operando e identificando coeficientes:

$$1 = A(x+1)(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) + (Cx+D)(x-1)(x+1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{si } x=1 \quad 1=4A \\ \text{si } x=-1 \quad 1=-4B \\ \text{si } x=i \quad 1=-2(Ci+D) \end{array} \right\} \mapsto \begin{cases} A=1/4 & B=-1/4 \\ 1=-2Ci-2D \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C=0 \\ D=-1/2 \end{cases}$$

• En consecuencia, resulta:

$$\int \frac{x^4}{x^4-1} dx = \int \left(1 + \frac{1}{x^4-1}\right) dx = x + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1} =$$

$$= x + \frac{1}{4} L(x-1) - \frac{1}{4} L(x+1) - \frac{1}{2} \arctg x + C = \boxed{x + L^4 \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} - \frac{1}{2} \arctg x + C}$$

CÁLCULO INTEGRAL: FUNCIONES IRRACIONALES



Calcular $\int \frac{x dx}{1+\sqrt{x}}$

Irracional simple: cambio $x = t^2 \mapsto \begin{cases} t = \sqrt{x} \\ dx = 2t dt \end{cases}$

$$\int \frac{x dx}{1+\sqrt{x}} = 2 \int \frac{t^3 dt}{1+t} = 2 \int \left(t^2 - t + 1 - \frac{1}{1+t} \right) dt = 2 \left[\frac{\sqrt{x^3}}{3} - \frac{x}{2} + \sqrt{x} - L(1+\sqrt{x}) \right] + C$$



Calcular $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3} - \sqrt{x}}$

Irracional simple: cambio $x = t^4 \mapsto \begin{cases} t = \sqrt[4]{x} \\ dx = 4t^3 dt \end{cases}$

$$\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x^3} - \sqrt{x}} = 4 \int \frac{t^3 dt}{t^3 - t^2} = 4 \int \frac{t dt}{t-1} = 4 \int \left(1 + \frac{1}{t-1} \right) dt = 4 \left[\sqrt[4]{x} + L(\sqrt[4]{x} - 1) \right] + C$$



Calcular $\int \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} dx$

Irracional lineal: cambio $\frac{x+1}{x-1} = t^2 \quad x = \frac{t^2+1}{t^2-1} \quad dx = \frac{-4t}{(t^2-1)^2} dt$

$$\int \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} dx = \int \frac{-4t^2}{(t^2-1)^2} dt \quad \oplus$$

Considerando $d\left(\frac{1}{t^2-1}\right) = \frac{-2t dt}{(t^2-1)^2}$ se integra por partes:


$$u = 2t \Rightarrow du = 2 dt$$

$$dv = \frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt \Rightarrow v = \int \frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt = \int d\left(\frac{1}{t^2-1}\right) = \frac{1}{t^2-1}$$

$$\oplus \int \frac{-4t^2}{(t^2-1)^2} dt = \int 2t \left(\frac{-2t}{(t^2-1)^2} dt \right) = \frac{2t}{t^2-1} - \int \frac{2 dt}{t^2-1} = \frac{2t}{t^2-1} + 2 \int \frac{dt}{1-t^2} =$$

$$= \frac{2t}{t^2-1} + 2 \operatorname{ArgTh} t + C = \sqrt{x^2-1} + 2 \operatorname{ArgTh} \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} + C$$

Operando: $\frac{2t}{t^2-1} = \frac{2\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}}{\frac{x+1}{x-1}-1} = \frac{2(x-1)\sqrt{x+1}}{2\sqrt{x-1}} = \sqrt{x^2-1}$

 Calcular $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{a^2+x^2}}$

Irracional binomia tipo $\int x^k (b+ax^h)^p dx$ donde $k=3$ $h=2$ $p=-\frac{1}{2}$

Siendo $\frac{k+1}{h} = 2$ entero, se hace el cambio $a^2+x^2 = t^2 \begin{cases} x^2 = t^2 - a^2 \\ x dx = t dt \end{cases}$

$$\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{a^2+x^2}} = \int \frac{(t^2-a^2)t}{t} dt = \int (t^2-a^2) dt = \frac{t^3}{3} - a^2 t + C = \frac{\sqrt{(a^2+x^2)^3}}{3} - a^2 \sqrt{a^2+x^2} + C$$

 Calcular $\int \frac{dx}{(9+4x^2)^{5/2}}$

$$\int \frac{dx}{(9+4x^2)^{5/2}} = \int (9+4x^2)^{-5/2} dx$$

Irracional binomia tipo $\int x^k (b+ax^h)^p dx$ donde $k=0$ $h=2$ $p=-\frac{5}{2}$

Donde $\frac{k+1}{h} + p = -2$ entero, se multiplica y divide por $x^{hp} \equiv x^{2(-5/2)} = x^{-5}$

$$\int (9+4x^2)^{-5/2} dx = \int x^{-5} \frac{(9+4x^2)^{-5/2}}{x^{2(-5/2)}} dx = \int x^{-5} \left(\frac{9+4x^2}{x^2} \right)^{-5/2} dx \quad \oplus$$

Se hace el cambio $\frac{9+4x^2}{x^2} = t^2 \mapsto \begin{cases} x^2 = 9(t^2-4)^{-1} \\ x = 3(t^2-4)^{-1/2} \mapsto dx = -3t(t^2-4)^{-3/2} dt \end{cases}$

$$\oplus \int x^{-5} \left(\frac{9+4x^2}{x^2} \right)^{-5/2} dx = -\frac{1}{81} \int (t^2-4)^{5/2} t^{-5} t (t^2-4)^{-3/2} dt =$$

$$= -\frac{1}{81} \int t^{-4} (t^2-4) dt = -\frac{1}{81} \int (t^2-4t^{-4}) dt = -\frac{1}{81} \left[-\frac{1}{t} + \frac{4}{3t^3} \right] + C =$$

$$= \frac{1}{81} \frac{x}{\sqrt{9+4x^2}} - \frac{4}{243} \frac{x^3}{\sqrt{(9+4x^2)^3}} + C$$



Calcular $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+4x-4}}$

Se trata de una integral del tipo $\int R[x, \sqrt{ax^2+bx+c}] dx$ que cuando $a > 0$ se transforma en una integral racional con el cambio $\sqrt{ax^2+bx+c} = \sqrt{a}x+t$

$$\sqrt{x^2+4x-4} = x+t \quad \mapsto \quad x^2+4x-4 = x^2+2xt+t^2 \quad \mapsto \quad x = \frac{4+t^2}{4-2t}$$

$$t = \sqrt{x^2+4x-4} - x$$

$$dx = \frac{2(-t^2+4t+4)}{(-2t+4)^2} dt$$

$$\sqrt{x^2+4x-4} = \frac{4+t^2}{4-2t} + t = \frac{-t^2+4t+4}{4-2t}$$

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+4x-4}} = \int \frac{\cancel{4-2t}}{4+t^2} \frac{\cancel{4-2t}}{-\cancel{t^2+4t+4}} \frac{2(-\cancel{t^2+4t+4})}{(\cancel{-2t+4})^2} dt = 2 \int \frac{dt}{4+t^2} = \frac{2}{4} \int \frac{dt}{1+(t/2)^2} =$$

$$= \int \frac{(1/2)dt}{1+(t/2)^2} = \text{arctg} \frac{t}{2} + C = \boxed{\text{arctg} \frac{\sqrt{x^2+4x-4} - x}{2} + C}$$



Calcular $\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{-4x^2+5x+9}}$

Se trata de una integral del tipo $\int R[x, \sqrt{ax^2+bx+c}] dx$ que cuando $\begin{cases} a < 0 \\ c > 0 \end{cases}$ se transforma en una integral racional con el cambio $\sqrt{ax^2+bx+c} = tx + \sqrt{c}$

$$\sqrt{-4x^2+5x+9} = tx+3 \quad \mapsto \quad \begin{cases} -4x^2+5x+9 = t^2x^2+6tx+9 \\ -4x+5 = t^2x+6t \end{cases} \quad \mapsto \quad x = \frac{5-6t}{4+t^2}$$


$$(x+1) = \frac{t^2-6t+9}{4+t^2} \quad \sqrt{-4x^2+5x+9} = t \left(\frac{5-6t}{4+t^2} \right) + 3 = \frac{-3t^2+5t+12}{4+t^2}$$

$$x = \frac{5-6t}{4+t^2} \mapsto dx = \frac{2(3t^2-5t-12)}{(4+t^2)^2} dt$$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{-4x^2+5x+9}} = \int \frac{\cancel{4+t^2}}{(t^2-6t+9)} \times \frac{\cancel{4+t^2}}{(-3t^2+5t+12)} \times \frac{2(3t^2-5t-12)}{(4+t^2)^2} dt =$$

$$= -2 \int \frac{dt}{t^2-6t+9} = -2 \int \frac{dt}{(t-3)^2} = \frac{2}{t-3} + C = \boxed{\frac{2x}{\sqrt{-4x^2+5x+9}-3(1+x)} + C}$$

Siendo $\sqrt{-4x^2+5x+9} = tx+3 \mapsto t = \frac{\sqrt{-4x^2+5x+9}-3}{x}$

 Calcular $\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{-x^2+5x-4}}$

1 MÉTODO

Se trata de una integral del tipo $\int \frac{dx}{(h+kx)^n \sqrt{ax^2+bx+c}}$ que con el cambio $\frac{1}{h+kx} = t$ se transforma en una integral $\int \frac{P(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ siendo P(x) un polinomio de grado n.

$$\frac{1}{x-2} = t \mapsto x = 2 + \frac{1}{t} \mapsto dx = -\frac{1}{t^2} dt$$

$$\sqrt{-x^2+5x-4} = \sqrt{-\left(2+\frac{1}{t}\right)^2 + 5\left(2+\frac{1}{t}\right) - 4} = \sqrt{\frac{2t^2+t-1}{t^2}} = \frac{\sqrt{2t^2+t-1}}{t}$$

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{-x^2+5x-4}} = - \int t \frac{t}{\sqrt{2t^2+t-1}} t^{-2} dt = - \int \frac{dt}{\sqrt{2t^2+t-1}} = \odot$$

Completando el cuadrado de $(2t^2+t-1)$:

$$2t^2+t-1 = \left(\sqrt{2}t + \frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 - \frac{9}{8} = \left(\frac{4t+1}{2\sqrt{2}}\right)^2 - \frac{9}{8} = \frac{1}{8}(4t+1)^2 - \frac{9}{8} = \frac{9}{8} \left[\left(\frac{4t+1}{3}\right)^2 - 1\right]$$

$$\odot = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \int \frac{dt}{\sqrt{\left(\frac{4t+1}{3}\right)^2 - 1}} = -\frac{2\sqrt{2}}{3} \int \frac{dt}{\sqrt{\left(\frac{4t+1}{3}\right)^2 - 1}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{\left(\frac{4t+1}{3}\right)^2 - 1}} =$$

$$= -\frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{Arg Ch} \left(\frac{4t+1}{3} \right) + C$$

Deshaciendo el cambio $t = \frac{1}{x-2}$ resulta:

$$\int \frac{dx}{(x-2)\sqrt{-x^2+5x-4}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \operatorname{Arg Ch} \left(\frac{2+x}{3x-6} \right) + C$$

2 MÉTODO

Se trata de una integral del tipo $\int R\left[x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right] dx$ que cuando $\begin{cases} a < 0 \\ c < 0 \end{cases}$ se transforma

en una integral racional con el cambio $\sqrt{ax^2+bx+c} = t(x-x_1)$ siendo x_1 una raíz de $ax^2+bx+c=0$

Siendo $(-x^2+5x-4) = -(x-4)(x-1)$ se puede hacer el cambio:

$$\sqrt{-x^2+5x-4} = \sqrt{-(x-4)(x-1)} = t(x-1) \quad \mapsto \quad \begin{cases} -(x-4)(x-1) = t^2(x-1)^2 \\ x = \frac{4+t^2}{1+t^2} \end{cases}$$



Calcular $\int \sqrt{4x^2+3x-5} dx$

Es una integral del tipo $\int \sqrt{ax^2+bx+c} dx$ que multiplicando y dividiendo por

$\sqrt{ax^2+bx+c} dx$ se transforma en una integral $\int \frac{P(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ siendo $P(x)$ un polinomio de grado n , que se resuelve planteando la igualdad:

$$\int \frac{P(x)dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}} = Q(x) \cdot \sqrt{ax^2+bx+c} + K \int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$$

$Q(x)$ es un polinomio de grado $(n-1)$. Para calcular las constantes hay que derivar ambos miembros de la igualdad.

$$\int \sqrt{4x^2+3x-5} dx = \int \frac{4x^2+3x-5}{\sqrt{4x^2+3x-5}} dx = (Cx+D) \cdot \sqrt{4x^2+3x-5} + E \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+3x-5}}$$

Derivando la expresión:

$$\frac{4x^2 + 3x - 5}{\sqrt{4x^2 + 3x - 5}} = C \sqrt{4x^2 + 3x - 5} + (Cx + D) \frac{8x + 3}{2\sqrt{4x^2 + 3x - 5}} + \frac{E}{\sqrt{4x^2 + 3x - 5}}$$

$$4x^2 + 3x - 5 = C(4x^2 + 3x - 5) + (Cx + D) \left(\frac{4x + 3}{2} \right) + E$$

$$\text{Identificando coeficientes: } \begin{cases} 8C = 4 \\ \frac{9}{2}C + 4D = 3 \\ -5C + \frac{3}{2}D + E = -5 \end{cases} \mapsto \begin{cases} C = 1/2 \\ D = 3/16 \\ E = -89/32 \end{cases}$$

Resultando:

$$\int \sqrt{4x^2 + 3x - 5} \, dx = \left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{16} \right) \cdot \sqrt{4x^2 + 3x - 5} - \frac{89}{32} \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 3x - 5}} \quad \odot$$

Completando el cuadrado

$$4x^2 + 3x - 5 = \left(2x + \frac{3}{4} \right)^2 - \frac{89}{16} = \left(\frac{8x + 3}{4} \right)^2 - \frac{89}{16} = \frac{89}{16} \left[\left(\frac{8x + 3}{\sqrt{89}} \right)^2 - 1 \right]$$

con lo que,

$$\frac{89}{32} \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 3x - 5}} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{8x + 3}{\sqrt{89}} \right)^2 - 1}} = \frac{1}{2} \int \frac{(\sqrt{89}/8) du}{\sqrt{u^2 - 1}} = \frac{\sqrt{89}}{16} \text{Arg Ch} \left(\frac{8x + 3}{\sqrt{89}} \right)$$

$$\odot \int \sqrt{4x^2 + 3x - 5} \, dx = \left(\frac{1}{2}x + \frac{3}{16} \right) \cdot \sqrt{4x^2 + 3x - 5} - \frac{\sqrt{89}}{16} \text{Arg Ch} \left(\frac{8x + 3}{\sqrt{89}} \right) + C$$

CÁLCULO INTEGRAL: MÉTODO DE HERMITE



Calcular $\int \frac{2x-1}{(x^2-6x+13)^2} dx$

Aplicando el método de Hermite:

$$\frac{2x-1}{(x^2-6x+13)^2} = \frac{Ax+B}{x^2-6x+13} + \frac{d}{dx} \left[\frac{Cx+D}{x^2-6x+13} \right] \quad (i)$$

efectuando la derivación, se tiene:

$$\frac{2x-1}{(x^2-6x+13)^2} = \frac{Ax+B}{x^2-6x+13} + \frac{C(x^2-6x+13) - (Cx+D)(2x-6)}{(x^2-6x+13)^2}$$

simplificando,

$$2x-1 = (Ax+B)(x^2-6x+13) + C(x^2-6x+13) - (Cx+D)(2x-6)$$

$$2x-1 = Ax^3 + x^2(-6A+B-C) + x(13A-6B-2D) + (13B+13C+6D)$$

Identificando coeficientes:

$$\begin{cases} A=0 \\ -6A+B-C=0 \\ 13A-6B-2D=2 \\ 13B+13C+6D=-1 \end{cases} \mapsto \begin{cases} B-C=0 \\ -6B-2D=2 \\ 13B+13C+6D=-1 \end{cases} \mapsto \begin{cases} B=C \\ -6B-2D=2 \\ 26B+6D=-1 \end{cases}$$

$$A=0 \quad B=C=\frac{5}{8} \quad D=-\frac{23}{8}$$

En consecuencia:

$$\begin{aligned} (i) \int \frac{2x-1}{(x^2-6x+13)^2} dx &= \int \frac{5/8}{x^2-6x+13} dx + \int \frac{d}{dx} \left[\frac{(5/8)x - (23/8)}{x^2-6x+13} \right] dx = \\ &= \frac{5x-23}{8(x^2-6x+13)} + \frac{5}{8} \int \frac{dx}{x^2-6x+13} \end{aligned}$$

Completando el cuadrado: $(x^2-6x+1) = 4 + (x-3)^2$

$$\int \frac{dx}{x^2-6x+13} = \int \frac{dx}{4+(x-3)^2} = \int \frac{dx}{1+[(x-3)/2]^2} = \frac{1}{2} \operatorname{arctag} \left(\frac{x-3}{2} \right)$$

$$\text{Finalmente, } \int \frac{2x-1}{(x^2-6x+13)^2} dx = \frac{5x-23}{8(x^2-6x+13)} + \frac{5}{16} \operatorname{arctag} \left(\frac{x-3}{2} \right) + C$$



Calcular $\int \frac{x+3}{x(x^2+x+1)^2} dx$

Aplicando el método de Hermite:

$$\frac{x+3}{x(x^2+x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} + \frac{d}{dx} \left[\frac{Dx+E}{x^2+x+1} \right] \quad (i)$$

efectuando la derivación, se tiene:

$$\frac{x+3}{x(x^2+x+1)^2} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} + \frac{D(x^2+x+1) - (Dx+E)(2x+1)}{(x^2+x+1)^2}$$

simplificando

$$x+3 = A(x^2+x+1)^2 + (Bx+C)x(x^2+x+1) + D(x^2+x+1) - (Dx+E)(2x+1)$$

$$x+3 = (A+B)x^4 + (2A+B+C)x^3 + (3A+B+C-D)x^2 + (2A+C-2E)x + (A+D-E)$$

Identificando coeficientes:

$$\begin{cases} A+B=0 \\ 2A+B+C=0 \\ 3A+B+C-D=0 \\ 2A+C-2E=1 \\ A+D-E=3 \end{cases} \mapsto \begin{cases} B=-A \\ A+C=0 \\ 2A+C-D=0 \\ 2A+C-2E=1 \\ A+D-E=3 \end{cases} \mapsto \begin{cases} C=-A \\ A-D=0 \\ A-2E=1 \\ A+D-E=3 \end{cases} \mapsto \begin{cases} D=A \\ A-2E=1 \\ 2A-E=3 \end{cases}$$

$$A = \frac{5}{3} \quad B = -\frac{5}{3} \quad C = -\frac{5}{3} \quad D = \frac{5}{3} \quad E = \frac{1}{3}$$

En consecuencia:

$$(i) \int \frac{x+3}{x(x^2+x+1)^2} dx = \int \frac{5/3}{x} dx + \int \frac{-(5/3)x - (5/3)}{x^2+x+1} dx + \int \frac{d}{dx} \left[\frac{(5/3)x + (1/3)}{x^2+x+1} \right] dx =$$

$$= \frac{5}{3} \int \frac{dx}{x} - \frac{5}{3} \int \frac{x+1}{x^2+x+1} dx + \frac{5x+1}{3(x^2+x+1)} = \frac{5}{3} Lx + \frac{5x+1}{3(x^2+x+1)} - \frac{5}{3} \int \frac{x+1}{x^2+x+1} dx$$

$$\bullet \int \frac{x+1}{x^2+x+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+x+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(2x+1)+1}{x^2+x+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(2x+1)}{x^2+x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+x+1} dx =$$

$$= \frac{1}{2} L(x^2+x+1) + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+x+1} dx = \frac{1}{2} L(x^2+x+1) + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+x+1} dx \quad (ii)$$

Completando el cuadrado:

$$(x^2 + x + 1) = \frac{3}{4} + \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} \left[1 + \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2\right]$$

$$\therefore \int \frac{1}{x^2 + x + 1} dx = \frac{4}{3} \int \frac{dx}{1 + \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right)$$

Finalmente,

$$\int \frac{x+3}{x(x^2+x+1)^2} dx = \frac{5}{3} Lx + \frac{5x+1}{3(x^2+x+1)} - \frac{5}{3} \sqrt{L(x^2+x+1)} - \frac{5}{3} \frac{1}{2} \frac{2\sqrt{3}}{3} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C =$$

$$= \frac{5}{3} Lx + \frac{5x+1}{3(x^2+x+1)} - \frac{5}{3} \sqrt{L(x^2+x+1)} - \frac{5}{3\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C$$



Calcular $\int \frac{dx}{(1+x^2)^3}$

Aplicando el método de Hermite:

$$\frac{1}{(1+x^2)^3} = \frac{Ax+B}{1+x^2} + \frac{d}{dx} \left[\frac{Cx^3 + Dx^2 + Ex + F}{(1+x^2)^2} \right] \quad (i)$$

efectuando la derivación, se tiene:

$$\frac{1}{(1+x^2)^3} = \frac{Ax+B}{1+x^2} + \frac{(3Cx^2 + 2Dx + E)(1+x^2) - 4(Cx^3 + Dx^2 + Ex + F)}{(1+x^2)^3}$$

simplificando

$$1 = (Ax+B)(1+x^2)^2 + (3Cx^2 + 2Dx + E)(1+x^2) - 4(Cx^3 + Dx^2 + Ex + F)$$

$$1 = Ax^5 + (B-C)x^4 + (2A-2D)x^3 + (2B+3C-3E)x^2 + (A+2D-4F)x + (B+E)$$

Identificando coeficientes:

$$\begin{cases} A = 0 \\ B - C = 0 \\ 2A - 2D = 0 \\ 2B + 3C - 3E = 0 \\ A + 2D - 4F = 0 \\ B + E = 1 \end{cases} \mapsto \begin{cases} A = D = F = 0 \\ 5B - 3E = 0 \\ B + E = 1 \end{cases} \mapsto \begin{cases} A = D = F = 0 \\ B = C = 3/8 \\ E = 5/8 \end{cases}$$

En consecuencia:

$$(i) \int \frac{dx}{(1+x^2)^3} = \int \frac{(3/8)dx}{1+x^2} + \int \frac{d}{dx} \left[\frac{(3/8)x^3 + (5/8)x}{(1+x^2)^2} \right] dx$$

$$\int \frac{dx}{(1+x^2)^3} = \frac{3}{8} \int \frac{dx}{1+x^2} + \frac{3x^3 + 5x}{8(1+x^2)^2} = \frac{3}{8} \operatorname{arctg}x + \frac{3x^3 + 5x}{8(1+x^2)^2} + C$$

INTEGRALES TRIGONOMÉTRICAS



Calcular $\int \frac{dx}{1+\cos x}$

Se puede hacer el cambio $\left\{ \begin{array}{l} t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ dx = \frac{2}{1+t^2} dt \end{array} \right.$

$$1 + \cos x = \frac{2}{1+t^2}$$

$$\int \frac{dx}{1+\cos x} = \int \frac{(2/1+t^2) dt}{(2/1+t^2)} = \int dt = t + C = \operatorname{tg} \frac{x}{2} + C$$

- También se puede considerar: $1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$

Adviértase,

$$\cos x = \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{x}{2}\right) = \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2} - \operatorname{sen} \frac{x}{2} \cdot \operatorname{sen} \frac{x}{2} = \cos^2 \frac{x}{2} - \operatorname{sen}^2 \frac{x}{2}$$

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \operatorname{sen}^2 \frac{x}{2} = \cos^2 \frac{x}{2} - \left(1 - \cos^2 \frac{x}{2}\right) = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 \quad \mapsto \quad 1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$$

Por tanto, $\int \frac{dx}{1+\cos x} = \int \frac{(1/2)dx}{\cos^2(x/2)} = \operatorname{tg}(x/2) + C$



Calcular $\int \frac{dx}{\cos x}$

Haciendo el cambio: $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{(2/1+t^2) dt}{(1-t^2/1+t^2)} = 2 \int \frac{dt}{1-t^2} \quad \bullet$$

$$\frac{1}{1-t^2} = \frac{1}{(1-t)(1+t)} = \frac{A}{1-t} + \frac{B}{1+t}$$

Identificando coeficientes:


$$1 = (A-B)t + (A+B) \quad \mapsto \quad \begin{cases} A-B=0 \\ A+B=1 \end{cases} \Rightarrow A=B=\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad 2 \int \frac{1}{1-t^2} dt &= 2 \int \frac{1/2}{1-t} dt + 2 \int \frac{1/2}{1+t} dt = -\int \frac{dt}{1-t} + \int \frac{dt}{1+t} = -L(1-t) + L(1+t) + C = \\ &= L \frac{1+t}{1-t} + C = \boxed{L \frac{1+\operatorname{tg} x / 2}{1-\operatorname{tg} x / 2} + C} \end{aligned}$$


⊙ Considerando como impar en **cos x** se puede hacer el cambio:

$$\operatorname{sen} x = t \quad \mapsto \quad \begin{cases} \cos x = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 x} = \sqrt{1 - t^2} \\ \cos x \, dx = dt \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} \end{cases}$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{dt}{1-t^2} = L \frac{1+t}{1-t} + C = \boxed{L \frac{1+\operatorname{tg} x / 2}{1-\operatorname{tg} x / 2} + C}$$

 Calcular $\int \cos^3 x \, dx$

$$\begin{aligned} \int \cos^3 x \, dx &= \int \cos^2 x \cos x \, dx = \int (1 - \operatorname{sen}^2 x) \cos x \, dx = \int \cos x \, dx - \int \operatorname{sen}^2 x \cos x \, dx = \\ &= \operatorname{sen} x - \frac{1}{3} \operatorname{sen}^3 x + C \end{aligned}$$

 Calcular $\int \operatorname{sen}^4 x \, dx$

$$\text{Siendo, } \cos 2x = \cos(x+x) = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x = \begin{cases} = \cos^2 x - (1 - \cos^2 x) = 2\cos^2 x - 1 \\ = (1 - \operatorname{sen}^2 x) - \operatorname{sen}^2 x = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x \end{cases}$$

$$\cos 2x = \begin{cases} = 2\cos^2 x - 1 \\ = 1 - 2\operatorname{sen}^2 x \end{cases} \quad \mapsto \quad \begin{aligned} \cos^2 x &= \frac{1 + \cos 2x}{2} \\ \operatorname{sen}^2 x &= \frac{1 - \cos 2x}{2} \end{aligned}$$

$$\int \operatorname{sen}^4 x \, dx = \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x) dx =$$

$$= \frac{1}{4} x - \frac{1}{4} \operatorname{sen} 2x + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x \, dx = \frac{1}{4} x - \frac{1}{4} \operatorname{sen} 2x + \frac{1}{4} \int \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right) dx =$$

$$= \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\text{sen}2x + \frac{1}{8} \int dx + \frac{1}{8} \int \cos 4x dx = \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\text{sen}2x + \frac{1}{8}x + \frac{1}{32} \int 4 \cos 4x dx =$$

$$= \frac{1}{4}x - \frac{1}{4}\text{sen}2x + \frac{1}{8}x + \frac{1}{32}\text{sen}4x + C$$

 Calcular $\int \frac{dx}{\text{sen} x \cos x}$

$$\int \frac{dx}{\text{sen} x \cos x} = \int \frac{\text{sen}^2 x + \cos^2 x}{\text{sen} x \cos x} dx = \int \frac{\text{sen}^2 x}{\text{sen} x \cos x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{\text{sen} x \cos x} dx =$$

$$= \int \frac{\text{sen} x}{\cos x} dx + \int \frac{\cos x}{\text{sen} x} dx = -L\cos x + L\text{sen} x + C = L\frac{\text{sen} x}{\cos x} + C = L\text{tg} x + C$$

 Calcular $\int \frac{\text{tg} x}{1 + \text{sen}^2 x} dx$

$$t = \text{tg} x \quad x = \text{arctg} t \quad dx = \frac{dt}{1+t^2} \quad t^2 = \frac{\text{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{\text{sen}^2 x}{1 - \text{sen}^2 x} \quad \mapsto \quad \text{sen} x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$$

$$1 + \text{sen}^2 x = 1 + \frac{t^2}{1+t^2} = \frac{1+2t^2}{1+t^2}$$

$$\int \frac{\text{tg} x}{1 + \text{sen}^2 x} dx = \int \frac{t \cancel{(1+t^2)}}{(1+2t^2) \cancel{1+t^2}} \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{t}{(1+2t^2)} dt = \frac{1}{4} \int \frac{4t}{1+2t^2} dt = \frac{1}{4} L(1+2t^2) + C =$$

$$= \frac{1}{4} L(1+2\text{tg}^2 x) + C = L\sqrt[4]{1+2\text{tg}^2 x} + C$$

 Calcular $\int \frac{dx}{\cos x - \text{sen} x}$

$$t = \text{tg} \frac{x}{2} \quad x = 2\text{arctg} t \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2} \quad \text{sen} x = \frac{2t}{1+t^2} \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$


$$\cos x - \text{sen} x = \frac{1-t^2}{1+t^2} - \frac{2t}{1+t^2} = \frac{1-t^2-2t}{1+t^2}$$

$$\int \frac{dx}{\cos x - \text{sen} x} = \int \frac{\cancel{1+t^2}}{-t^2-2t+1} \frac{2dt}{\cancel{1+t^2}} = -2 \int \frac{dt}{t^2+2t-1} = -2 \int \frac{dt}{(t+1)^2-2} \oplus$$

$$\frac{1}{(t+1)^2 - 2} = \frac{1}{(t+1-\sqrt{2})(t+1+\sqrt{2})} = \frac{A}{t+1-\sqrt{2}} + \frac{B}{t+1+\sqrt{2}}$$

Identificando coeficientes $\begin{cases} A+B=0 \\ (1+\sqrt{2})A+(1-\sqrt{2})B=1 \end{cases} \mapsto A = \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad B = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$

$$\begin{aligned} \oplus \quad -2 \int \frac{dt}{(t+1)^2 - 2} &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{t+1-\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{t+1+\sqrt{2}} = \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} L|t+1-\sqrt{2}| + \frac{1}{\sqrt{2}} L|t+1+\sqrt{2}| + C = \frac{1}{\sqrt{2}} L \left| \frac{t+1+\sqrt{2}}{t+1-\sqrt{2}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{2}} L \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1 + \sqrt{2}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1 - \sqrt{2}} \right| + C \end{aligned}$$


 Ejercicios Calcular $\int \operatorname{sen}^5 x \cos^2 x \, dx$

$$\int \operatorname{sen}^5 x \cos^2 x \, dx = \int \operatorname{sen} x \operatorname{sen}^4 x \cos^2 x \, dx = \int \operatorname{sen} x (1 - \cos^2 x)^2 \cos^2 x \, dx =$$

$$= \int \operatorname{sen} x (1 - 2\cos^2 x + \cos^4 x) \cos^2 x \, dx =$$

$$= \int \operatorname{sen} x \cos^2 x \, dx - 2 \int \operatorname{sen} x \cos^4 x \, dx + \int \operatorname{sen} x \cos^6 x \, dx =$$

$$= -\frac{1}{3} \cos^3 x + \frac{2}{5} \cos^5 x - \frac{1}{7} \cos^7 x + C$$

 Ejercicios Calcular $\int \operatorname{sen} 5x \cos 4x \, dx$

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{sen}(5x+4x) &= \operatorname{sen} 5x \cos 4x + \cancel{\cos 5x \operatorname{sen} 4x} \\ \operatorname{sen}(5x-4x) &= \operatorname{sen} 5x \cos 4x - \cancel{\cos 5x \operatorname{sen} 4x} \\ \hline \operatorname{sen} 9x + \operatorname{sen} x &= 2 \operatorname{sen} 5x \cos 4x \end{aligned} \right\} \operatorname{sen} 5x \cos 4x = \frac{1}{2} (\operatorname{sen} 9x + \operatorname{sen} x)$$

$$\int \operatorname{sen} 5x \cos 4x \, dx = \frac{1}{2} \int (\operatorname{sen} 9x + \operatorname{sen} x) \, dx = -\frac{1}{18} \cos 9x - \frac{1}{2} \cos x + C$$



Calcular $\int \operatorname{tg}^3 x \, dx$

$$u = \operatorname{tg} x \quad x = \arctg u \quad dx = \frac{du}{1+u^2}$$

$$\int \operatorname{tg}^3 x \, dx = \int \frac{u^3}{1+u^2} du = \int \left(u - \frac{u}{1+u^2} \right) du = \frac{u^2}{2} - \frac{1}{2} L(1+u^2) + C = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} - \frac{1}{2} L(1+\operatorname{tg}^2 x) + C =$$

$$= \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} - \frac{1}{2} L \frac{1}{\cos^2 x} + C = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} + \frac{1}{2} L \cos^2 x + C = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} + L \cos x + C$$

INTEGRALES FUNCIONES HIPERBÓLICAS



Calcular $\int \text{Sh}5x \text{ Sh}3x \, dx$

El producto de la función subintegral se convierte en una suma:

$$\text{Ch}(5x + 3x) = \text{Ch}5x \cdot \text{Ch}3x + \text{Sh}5x \cdot \text{Sh}3x$$

$$\text{Ch}(5x - 3x) = \text{Ch}5x \cdot \text{Ch}3x - \text{Sh}5x \cdot \text{Sh}3x$$

$$\text{Ch}8x - \text{Ch}2x = 2 \text{Sh}5x \cdot \text{Sh}3x$$

$$\int \text{Sh}5x \text{ Sh}3x \, dx = \frac{1}{2} \int (\text{Ch}8x - \text{Ch}2x) \, dx = \frac{1}{16} \text{Sh}8x - \frac{1}{4} \text{Sh}2x + C$$



Calcular $\int \frac{\text{Sh}x}{1 + \text{Sh}x} \, dx$

Se parte del cambio general de las integrales hiperbólicas:

$$t = \text{Th} \frac{x}{2} \quad \mapsto \quad dx = \frac{2dt}{1-t^2} \quad \text{Sh}x = \frac{2t}{1-t^2} \quad \text{Ch}x = \frac{1+t^2}{1-t^2} \quad 1 + \text{Sh}x = \frac{-t^2 + 2t + 1}{1-t^2}$$

$$\int \frac{\text{Sh}x}{1 + \text{Sh}x} \, dx = \int \frac{\cancel{1-t^2}}{-t^2 + 2t + 1} \times \frac{2t}{\cancel{1-t^2}} \times \frac{2dt}{1-t^2} = \int \frac{4t \, dt}{(-t^2 + 2t + 1)(1-t^2)} \quad \odot$$

Descomponiendo en fracciones simples la función racional:

$$\frac{4t}{(-t^2 + 2t + 1)(1-t^2)} = \frac{A+Bt}{-t^2 + 2t + 1} + \frac{C}{1-t} + \frac{D}{1+t}$$

Identificando coeficientes:

$$4t = (-B - C + D)t^3 + (-A + C - 3D)t^2 + (B + 3C + D)t + (A + C + D)$$

$$A = -2 \quad B = 0 \quad C = D = 1$$

$$\odot \int \frac{4t \, dt}{(-t^2 + 2t + 1)(1-t^2)} = \int \frac{-2 \, dt}{-t^2 + 2t + 1} + \int \frac{dt}{1-t} + \int \frac{dt}{1+t} =$$

$$= -2 \int \frac{dt}{2 - (t-1)^2} + \int \frac{dt}{1-t} + \int \frac{dt}{1+t} = -\sqrt{2} \int \frac{(1/\sqrt{2}) \, dt}{1 - \left(\frac{t-1}{\sqrt{2}}\right)^2} + \int \frac{dt}{1-t} + \int \frac{dt}{1+t} =$$

$$= -\sqrt{2} \text{Arg Th} \left(\frac{t-1}{\sqrt{2}} \right) - L|1-t| + L|1+t| + C = -\sqrt{2} \text{Arg Th} \left(\frac{t-1}{\sqrt{2}} \right) + L \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C$$

Deshaciendo el cambio $t = \text{Th} \frac{x}{2}$

$$\int \frac{\text{Sh}x}{1+\text{Sh}x} dx = -\sqrt{2} \text{Arg Th} \left(\frac{\text{Th} \frac{x}{2} - 1}{\sqrt{2}} \right) + L \left| \frac{1 + \text{Th} \frac{x}{2}}{1 - \text{Th} \frac{x}{2}} \right| + C$$

CÁLCULO INTEGRAL: FUNCIÓN GAMMA



Calcular $\int_0^1 (Lx)^4 dx$

Se lleva a una integral $\Gamma(p) = \int_0^\infty x^{p-1} e^{-x} dx$ con el cambio:

$$Lx = -t \Rightarrow \begin{cases} x = e^{-t} & \Rightarrow dx = -e^{-t} dt \\ x = 1 & \Rightarrow t = 0 \\ x = 0 & \Rightarrow t = \infty \end{cases}$$

$$\int_0^1 (Lx)^4 dx = \int_\infty^0 -(-t)^4 e^{-t} dt = \int_0^\infty (-t)^4 e^{-t} dt = \int_0^\infty t^4 e^{-t} dt = \Gamma(5) = 4! = 24 \quad p-1=4 \mapsto p=5$$



Calcular $\int_0^1 \sqrt[3]{L(1/x)} dx$

Se hace el cambio

$$L\frac{1}{x} = -Lx = t \Rightarrow \begin{cases} x = e^{-t} & \Rightarrow dx = -e^{-t} dt \\ x = 1 & \Rightarrow t = 0 \\ x = 0 & \Rightarrow t = \infty \end{cases}$$

$$\int_0^1 \sqrt[3]{L(1/x)} dx = \int_\infty^0 -\sqrt[3]{t} e^{-t} dt = \int_0^\infty t^{1/3} e^{-t} dt = \Gamma\left(\frac{1}{3} + 1\right) = \Gamma\left(\frac{4}{3}\right)$$



Calcular $\int_0^\infty x^4 e^{-5x^2} dx$

Se hace el cambio

$$5x^2 = t \mapsto x = \frac{t^{1/2}}{\sqrt{5}} \Rightarrow \begin{cases} dx = \frac{1}{2\sqrt{5}} t^{-1/2} dt \\ x = \infty & \Rightarrow t = \infty \\ x = 0 & \Rightarrow t = 0 \end{cases}$$

$$\int_0^\infty x^4 e^{-5x^2} dx = \int_0^\infty \left(\frac{t^{1/2}}{\sqrt{5}}\right)^4 \left(\frac{1}{2\sqrt{5}}\right) t^{-1/2} e^{-t} dt = \frac{1}{50\sqrt{5}} \int_0^\infty t^{3/2} e^{-t} dt = \frac{1}{50\sqrt{5}} \Gamma\left(\frac{3}{2} + 1\right)$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4} \sqrt{\pi}$$

Por tanto,

$$\int_0^{\infty} x^4 e^{-5x^2} dx = \frac{1}{50\sqrt{5}} \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{200} \sqrt{\frac{\pi}{5}}$$

CÁLCULO INTEGRAL: FUNCIÓN BETA



Calcular $\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx$

$$\int_0^1 \sqrt{\frac{1-x}{x}} dx = \int_0^1 x^{-1/2} (1-x)^{1/2} dx = \beta\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma(1/2)\Gamma(3/2)}{\Gamma(2)} = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Se considera } \begin{cases} p-1 = -\frac{1}{2} \mapsto p = \frac{1}{2} \\ q-1 = \frac{1}{2} \mapsto q = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\text{Adviértase que } \Gamma(1/2)\Gamma(3/2) = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = \frac{\pi}{2}$$



Calcular $\int_0^1 \sqrt{1-x^5} dx$

$$\text{Se hace el cambio: } x^5 = t \mapsto x = t^{1/5} \Rightarrow \begin{cases} dx = \frac{1}{5} t^{-4/5} dt \\ x = 1 \Rightarrow t = 1 \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \end{cases}$$

$$\int_0^1 \sqrt{1-x^5} dx = \frac{1}{5} \int_0^1 t^{-4/5} (1-t)^{1/2} dt = \frac{1}{5} \beta\left(\frac{1}{5}, \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{5} \frac{\Gamma(1/5)\Gamma(3/2)}{\Gamma(17/10)}$$

$$\text{Se considera } \begin{cases} p-1 = -\frac{4}{5} \mapsto p = \frac{1}{5} \\ q-1 = \frac{1}{2} \mapsto q = \frac{3}{2} \end{cases}$$

$$\text{Por recurrencia: } \Gamma(6/5) = \left(\frac{6}{5}-1\right) \Gamma\left(\frac{6}{5}-1\right) = \left(\frac{1}{5}\right) \Gamma\left(\frac{1}{5}\right)$$

$$\text{Resultando: } \int_0^1 \sqrt{1-x^5} dx = \frac{\Gamma(6/5)\Gamma(3/2)}{\Gamma(17/10)}$$



Calcular $\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^3}$

Se hace el cambio: $x^3 = t \mapsto x = t^{1/3} \Rightarrow \begin{cases} dx = \frac{1}{3} t^{-2/3} dt \\ x = \infty \Rightarrow t = \infty \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \end{cases}$

Resultando:

$$\int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^3} = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} \frac{t^{-2/3}}{1+t} dt = \frac{1}{3} \beta\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3} \frac{\Gamma(1/3)\Gamma(2/3)}{\Gamma(1)} = \frac{1}{3} \Gamma(1/3)\Gamma(2/3)$$

Se ha considerado $\begin{cases} p-1 = -\frac{2}{3} \mapsto p = \frac{1}{3} \\ p+q = 1 \mapsto q = \frac{2}{3} \end{cases}$



Calcular $\int_0^2 (4-x^2)^{3/2} dx$

$$(4-x^2) = 4 \left[1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2 \right] \mapsto (4-x^2)^{3/2} = 4^{3/2} \left[1 - \left(\frac{x}{2}\right)^2 \right]^{3/2} = 8 \left[1 - \frac{x^2}{4} \right]^{3/2}$$

$$\int_0^2 (4-x^2)^{3/2} dx = 8 \int_0^2 \left[1 - \frac{x^2}{4} \right]^{3/2} dx$$

Se hace el cambio: $\frac{x^2}{4} = t \mapsto x = 2t^{1/2} \Rightarrow \begin{cases} dx = t^{-1/2} dt \\ x = 2 \Rightarrow t = 1 \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \end{cases}$

$$\int_0^2 (4-x^2)^{3/2} dx = 8 \int_0^2 \left[1 - \frac{x^2}{4} \right]^{3/2} dx = 8 \int_0^1 t^{-1/2} (1-t)^{3/2} dt = 8 \beta\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

donde $\begin{cases} p-1 = -\frac{1}{2} \mapsto p = \frac{1}{2} \\ q-1 = \frac{3}{2} \mapsto q = \frac{5}{2} \end{cases}$

$$\int_0^2 (4-x^2)^{3/2} dx = 8 \beta\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}\right) = 8 \frac{\Gamma(1/2)\Gamma(5/2)}{\Gamma(3)} = 4 \Gamma(1/2)\Gamma(5/2) = 3\pi$$

$$\begin{cases} \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi} \\ \Gamma(5/2) = (3/2)\Gamma(3/2) = (3/2)(1/2)\Gamma(1/2) = (3/4)\sqrt{\pi} \end{cases}$$



Calcular $\int_0^{\pi} \frac{\sqrt{\sin x}}{(5+3\cos x)^{3/2}} dx$

Función trigonométrica racional, haciendo el cambio:

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \mapsto x = 2 \operatorname{arctg} t \begin{cases} dx = \frac{2 dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} & \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \\ x = \pi \mapsto t = \infty \\ x = 0 \mapsto t = 0 \end{cases}$$

operando en la función subintegral:

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{\sin x}}{(5+3\cos x)^{3/2}} &= \frac{2^{1/2} t^{1/2} (1+t^2)^{-1/2}}{5+3\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^{3/2}} = \frac{2^{1/2} t^{1/2} (1+t^2)^{-1/2}}{\left(\frac{8+2t^2}{1+t^2}\right)^{3/2}} = \\ &= \frac{2^{1/2} t^{1/2} (1+t^2)^{-1/2}}{2^{3/2} (4+t^2)^{3/2} (1+t^2)^{-3/2}} = \frac{t^{1/2} (1+t^2)}{2(4+t^2)^{3/2}} \end{aligned}$$

con lo que

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{\sqrt{\sin x}}{(5+3\cos x)^{3/2}} dx &= \int_0^{\infty} \frac{\cancel{t^{1/2}} \cancel{(1+t^2)}^{\cancel{-1/2}}}{\cancel{2} (4+t^2)^{3/2} \cancel{1+t^2}} dt = \int_0^{\infty} \frac{t^{1/2} dt}{(4+t^2)^{3/2}} = \\ &= \int_0^{\infty} \frac{t^{1/2} dt}{4^{3/2} (1+t^2/4)^{3/2}} = \frac{1}{8} \int_0^{\infty} \frac{t^{1/2} dt}{(1+t^2/4)^{3/2}} \quad (*) \end{aligned}$$

haciendo el cambio


$$u = \frac{t^2}{4} \mapsto t = 2u^{1/2} \begin{cases} dt = u^{-1/2} du \\ t = \infty \rightarrow u = \infty \\ t = 0 \rightarrow u = 0 \end{cases}$$

$$t^{1/2} = \sqrt{2} u^{1/4}$$

$$\begin{aligned} (*) &= \frac{1}{8} \int_0^{\infty} \frac{t^{1/2} dt}{(1+t^2/4)^{3/2}} = \frac{1}{8} \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{2} u^{1/4}}{(1+u)^{3/2}} u^{-1/2} du = \\ &= \frac{\sqrt{2}}{8} \int_0^{\infty} \frac{u^{-1/4}}{(1+u)^{3/2}} du = \frac{\sqrt{2}}{8} \beta\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right) \quad (**) \end{aligned}$$

En la función $\beta(p, q) \begin{cases} p-1 = -1/4 \mapsto p = 3/4 \\ p+q = 3/2 \mapsto q = 3/4 \end{cases}$

$$\begin{aligned}
 (\bullet\bullet) \int_0^\pi \frac{\sqrt{\operatorname{sen} x}}{(5+3\cos x)^{3/2}} dx &= \frac{\sqrt{2}}{8} \beta\left(\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{8} \frac{\Gamma(3/4)\Gamma(3/4)}{\Gamma(3/2)} = \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{8} \frac{[\Gamma(3/4)]^2}{(1/2)\Gamma(1/2)} = \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{[\Gamma(3/4)]^2}{\Gamma(1/2)} = \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{[\Gamma(3/4)]^2}{\sqrt{\pi}} = \frac{[\Gamma(3/4)]^2}{2\sqrt{2}\pi}
 \end{aligned}$$

 Calcular $\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{\operatorname{tg} x}}$

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{\operatorname{tg} x}} &= \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sqrt{\operatorname{sen} x / \cos x}} = \int_0^{\pi/2} (\operatorname{sen} x)^{-1/2} (\cos x)^{1/2} dx = \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} 2 (\operatorname{sen} x)^{-1/2} (\cos x)^{1/2} dx = \frac{1}{2} \beta\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right)
 \end{aligned}$$

En la función $\beta(p, q) \begin{cases} 2p-1 = -1/2 & \mapsto p = 1/4 \\ 2q-1 = 1/2 & \mapsto q = 3/4 \end{cases}$.

 Calcular $\int_0^{2\pi} \operatorname{sen}^8 x dx$

Como se trata de una potencia par de $\operatorname{sen} x$, se tiene:

$$\int_0^{2\pi} \operatorname{sen}^8 x dx = 2 \left(\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^8 x dx \right) = 2 \beta\left(\frac{9}{2}, \frac{1}{2}\right) \quad (\bullet)$$

En la función $\beta(p, q) \begin{cases} 2p-1 = 8 & \mapsto p = 9/2 \\ 2q-1 = 0 & \mapsto q = 1/2 \end{cases}$.

Por recurrencia: $\beta\left(\frac{9}{2}\right) = \frac{7}{2} \frac{5}{2} \frac{3}{2} \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{105}{16} \sqrt{\pi}$

$$2 \beta\left(\frac{9}{2}, \frac{1}{2}\right) = 2 \frac{\Gamma(9/2)\Gamma(1/2)}{\Gamma(5)} = 2 \frac{\frac{105}{16} \sqrt{\pi} \sqrt{\pi}}{4!} = \frac{35}{64} \pi$$

$$(\bullet) \int_0^{2\pi} \operatorname{sen}^8 x dx = \frac{35}{64} \pi$$

CÁLCULO INTEGRAL: DERIVACIÓN DE UNA INTEGRAL PARAMÉTRICA



Calcular $\int_0^{\infty} \frac{\text{sen } x}{x} dx$

Se parte de la integral $I = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\text{sen } x}{x} dx \quad \otimes$

Siendo $\text{Im}(e^{ix}) = \text{Im}(\cos x + i \text{sen } x) = \text{sen } x$

derivando respecto al parámetro a

$$\frac{dI}{da} = \int_0^{\infty} -x e^{-ax} \frac{\text{sen } x}{x} dx = \int_0^{\infty} -e^{-ax} \text{sen } x dx = \text{Im} \left(\int_0^{\infty} -e^{-ax} e^{ix} dx \right) =$$

$$= \text{Im} \left(\int_0^{\infty} -e^{-(a-i)x} dx \right) = \text{Im} \left(\frac{1}{a-i} \int_0^{\infty} -(a-i) e^{-(a-i)x} dx \right) =$$

$$= \text{Im} \left(\frac{1}{a-i} \int_0^{\infty} -(a-i) e^{-(a-i)x} dx \right) = \text{Im} \left(\frac{1}{a-i} e^{-(a-i)x} \right)_0^{\infty} = \text{Im} \left(-\frac{1}{a-i} \right) =$$

$$= -\text{Im} \left(\frac{1}{a-i} \right) = -\text{Im} \left[\frac{a+i}{(a-i)(a+i)} \right] = -\text{Im} \left[\frac{a+i}{1+a^2} \right] = \frac{-1}{1+a^2}$$

resultando

$$\frac{dI}{da} = \int_0^{\infty} -x e^{-ax} \frac{\text{sen } x}{x} dx = \frac{-1}{1+a^2} \quad \mapsto \quad I = \int \frac{-1}{1+a^2} da = -\text{arctg } a + C$$

Para $a = \infty$ se tiene:

$$\otimes I_{a=\infty} = \int_0^{\infty} 0 dx = 0 = -\text{arc tag } \infty + C = -\frac{\pi}{2} + C \quad \mapsto \quad C = \frac{\pi}{2}$$

El cálculo de la integral pedida cuando $a = 0$:

$$\otimes \int_0^{\infty} \frac{\text{sen } x}{x} dx = I_{a=0} = \int_0^{\infty} e^{-0} \frac{\text{sen } x}{x} dx = -\text{arctg } 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$



Calcular $\int_0^{\infty} \frac{\text{sen}^2 x}{x^2} dx$

Se parte de la integral $I = \int_0^{\infty} \frac{\text{sen}^2 ax}{x^2} dx \quad \otimes$

Derivando respecto al parámetro a

$$\frac{dI}{da} = \int_0^{\infty} \frac{2x \text{sen} ax \cos ax}{x^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{2 \text{sen} ax \cos ax}{x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\text{sen} 2ax}{x} dx \quad (\bullet)$$

haciendo el cambio: $2ax = t \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{t}{2a} & dx = \frac{dt}{2a} \\ x = \infty \mapsto t = \infty \\ x = 0 \mapsto t = 0 \end{cases}$

$$(\bullet) \int_0^{\infty} \frac{\text{sen} 2ax}{x} dx = \int_0^{\infty} \frac{\text{sen} t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$$

En consecuencia, $\frac{dI}{da} = \frac{\pi}{2} \mapsto I = \int \frac{\pi}{2} da = \frac{\pi}{2} a + C$

Para $a = 0$, se tiene: $\otimes I_{a=0} = \int_0^{\infty} 0 dx = 0 = 0 + C \mapsto C = 0$

Para el cálculo de la integral solicitada, se particulariza para $a = 1$

$$\otimes I_{a=1} = \int_0^{\infty} \frac{\text{sen}^2 x}{x^2} dx = \frac{\pi}{2}$$



Calcular $\int_0^1 x (Lx)^n dx$

Se parte de la integral $I = \int_0^1 x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{a+1}$

derivando sucesivamente respecto al parámetro a:

$$\frac{dI}{da} = \int_0^1 x^a Lx dx = \frac{d}{da} \left(\frac{1}{a+1} \right) = \frac{-1}{(a+1)^2} = \frac{-1!}{(a+1)^2}$$

$$\frac{d^2I}{da^2} = \int_0^1 x^a (Lx)^2 dx = \frac{d}{da} \left[\frac{-1}{(a+1)^2} \right] = \frac{2 \cdot 1}{(a+1)^3} = \frac{2!}{(a+1)^3}$$

$$\frac{d^3I}{da^3} = \int_0^1 x^a (Lx)^3 dx = \frac{d}{da} \left[\frac{2}{(a+1)^3} \right] = \frac{-3 \cdot 2 \cdot 1}{(a+1)^4} = \frac{-3!}{(a+1)^4}$$

.....

$$\frac{d^n I}{da^n} = \int_0^1 x^a (Lx)^n dx = \frac{d}{da} \left[\frac{2}{(a+1)^3} \right] = \frac{(-1)^n n!}{(a+1)^{n+1}}$$

Para $a = 1$ se obtiene el cálculo solicitado:

$$\left. \frac{d^n I}{da^n} \right|_{a=1} = \int_0^1 x^a (Lx)^n dx \Big|_{a=1} = \int_0^1 x (Lx)^n dx = \frac{(-1)^n n!}{(a+1)^{n+1}} \Big|_{a=1} = \frac{(-1)^n n!}{2^{n+1}}$$



Calcular $\int_0^\infty L \left(1 + \frac{a^2}{x^2} \right) dx$

Derivando respecto al parámetro a:

$$\frac{d}{da} \int_0^\infty L \left(1 + \frac{a^2}{x^2} \right) dx = \int_0^\infty \frac{2a/x^2}{1+a^2/x^2} dx = 2 \int_0^\infty \frac{a/x^2}{1+(a/x)^2} dx = -2 \int_\infty^0 \frac{dt}{1+t^2} dt =$$

$$= 2 \int_0^\infty \frac{dt}{1+t^2} dt = 2 \operatorname{arc} \operatorname{tg} t = 2 \left[\operatorname{arc} \operatorname{tg} \frac{a}{x} \right]_0^\infty = 2 \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \pi \quad \otimes$$

• cambio $t = \frac{a}{x} \mapsto \begin{cases} dt = -\frac{a}{x^2} dx \\ x = 0 \rightarrow t = \infty \\ x = \infty \rightarrow t = 0 \end{cases}$

⊗ $\frac{d}{da} \int_0^\infty L\left(1 + \frac{a^2}{x^2}\right) dx = \pi \Rightarrow \int_0^\infty L\left(1 + \frac{a^2}{x^2}\right) dx = \int \pi da = \pi a + C$

Para $a = 0$: $\int_0^\infty L(1) dx = \int_0^\infty 0 dx = 0 = 0 + C \rightarrow C = 0$

con lo que, $\int_0^\infty L\left(1 + \frac{a^2}{x^2}\right) dx = \pi a$



Calcular $\int_0^1 \frac{L(1+x)}{1+x^2} dx$

Se parte de la integral $I = \int_0^a \frac{L(1+ax)}{1+x^2} dx$ donde $\begin{cases} f(x,a) = \frac{L(1+ax)}{1+x^2} \\ f(a,a) = \frac{L(1+a^2)}{1+a^2} \end{cases}$

Derivando respecto al parámetro a , teniendo en cuenta que el límite superior de integración es también función del parámetro.

$\frac{d}{da} \int_0^a \frac{L(1+ax)}{1+x^2} dx = \int_0^a \frac{x}{(1+ax)(1+x^2)} dx + \frac{L(1+a^2)}{1+a^2}$ ⊗

Resulta una integral racional en x , que se resuelva mediante descomposición en fracciones simples:

$\frac{x}{(1+ax)(1+x^2)} = \frac{A}{1+ax} + \frac{Bx+C}{1+x^2} \rightarrow x = (A+aB)x^2 + (B+aC)x + (A+C)$

Identificando coeficientes:

$\begin{cases} A+C=0 \\ B+aC=1 \\ A+aB=0 \end{cases} \begin{cases} A=-C \\ B+aC=1 \\ aB-C=0 \end{cases} \Rightarrow B = \frac{1}{1+a^2} \quad C = \frac{a}{1+a^2} \quad A = \frac{-a}{1+a^2}$

de donde,

$$\int_0^a \frac{x}{(1+ax)(1+x^2)} dx = \frac{-1}{1+a^2} \int_0^a \frac{a dx}{1+ax} + \frac{1}{1+a^2} \int_0^a \frac{(x+a)}{1+x^2} dx =$$

$$= \frac{-1}{1+a^2} \int_0^a \frac{a dx}{1+ax} + \frac{1}{1+a^2} \int_0^a \frac{x dx}{1+x^2} + \frac{a}{1+a^2} \int_0^a \frac{dx}{1+x^2} =$$

$$= \frac{-1}{1+a^2} L(1+ax)|_0^a + \frac{1}{2(1+a^2)} L(1+x^2)|_0^a + \frac{a}{1+a^2} \operatorname{arctg} x|_0^a =$$

$$= \frac{-1}{1+a^2} L(1+a^2) + \frac{1}{2(1+a^2)} L(1+a^2) + \frac{a}{1+a^2} \operatorname{arctg} a =$$

$$= \frac{-L(1+a^2)}{1+a^2} + \frac{1}{2(1+a^2)} L(1+a^2) + \frac{a}{1+a^2} \operatorname{arctg} a$$

$$\otimes \frac{d}{da} \int_0^a \frac{L(1+ax)}{1+x^2} dx = \frac{-L(1+a^2)}{1+a^2} + \frac{1}{2(1+a^2)} L(1+a^2) + \frac{a}{1+a^2} \operatorname{arctg} a + \frac{L(1+a^2)}{1+a^2}$$

$$\frac{d}{da} \int_0^a \frac{L(1+ax)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2(1+a^2)} L(1+a^2) + \frac{a}{1+a^2} \operatorname{arctg} a$$

En definitiva,

$$\int_0^a \frac{L(1+ax)}{1+x^2} dx = \int \left[\frac{1}{2(1+a^2)} L(1+a^2) + \frac{a}{1+a^2} \operatorname{arctg} a \right] da =$$

$$= \int \frac{1}{2(1+a^2)} L(1+a^2) da + \int \frac{a}{1+a^2} \operatorname{arctg} a da = I_1 + I_2 \quad \bullet \bullet$$

$$I_1 = \int \frac{1}{2(1+a^2)} L(1+a^2) da = \frac{1}{2} L(1+a^2) \operatorname{arctg} a - \int \frac{a}{(1+a^2)} \operatorname{arctg} a da$$

$$u = L(1+a^2) \quad du = \frac{2a}{(1+a^2)} da$$

$$dv = \frac{da}{2(1+a^2)} \quad v = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} a$$

$$\bullet \bullet = I_1 + I_2 = \frac{1}{2} L(1+a^2) \operatorname{arctg} a - \int \frac{a}{(1+a^2)} \operatorname{arctg} a da + \int \frac{a}{1+a^2} \operatorname{arctg} a da + C$$

$$I = \int_0^a \frac{L(1+ax)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} L(1+a^2) \operatorname{arctg} a + C$$

Para $a = 0$: $I_{a=0} = \int_0^a 0 dx = 0 = 0 + C \rightarrow C = 0$

Por tanto: $I = \int_0^a \frac{L(1+ax)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} L(1+a^2) \operatorname{arctg} a$

Para $a = 1$: $I_{a=1} = \int_0^1 \frac{L(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} L2 \operatorname{arctg} 1 = \frac{\pi}{4} L\sqrt{2}$



Calcular $\int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} x}{x(1+x^2)} dx$

Se parte de la integral $I = \int_0^{\infty} \frac{\operatorname{arctg} ax}{x(1+x^2)} dx$

Derivando respecto al parámetro a

$$\frac{dI}{da} = \frac{d}{da} \int_0^{\infty} \frac{\cancel{x}}{\cancel{x}(1+x^2)(1+a^2x^2)} dx = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+a^2x^2)}$$

Resulta una integral racional en x , que se resuelva mediante descomposición en fracciones simples:

$$\frac{1}{(1+x^2)(1+a^2x^2)} = \frac{Ax+B}{1+x^2} + \frac{Cx+D}{1+a^2x^2}$$

Identificando coeficientes:

$$1 = (a^2A+C)x^3 + (a^2B+D)x^2 + (A+C)x + (B+D)$$

$$\begin{cases} a^2A+C=0 \\ a^2B+D=0 \\ A+C=0 \\ B+D=1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} C=-A & D=1-B \\ a^2A-A=0 \\ a^2B+1-B=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} A=0 & C=0 \\ B=\frac{-1}{a^2-1} & D=\frac{a^2}{a^2-1} \end{cases}$$

de donde,

$$\bullet \frac{dl}{da} = \frac{d}{da} \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+a^2x^2)} = \frac{-1}{a^2-1} \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} + \frac{a}{a^2-1} \int_0^{\infty} \frac{a dx}{1+(ax)^2} =$$

$$= \frac{-1}{a^2-1} \text{arc tag } x \Big|_0^{\infty} + \frac{a}{a^2-1} \text{arc tag } ax \Big|_0^{\infty} = \frac{-\pi}{2(a^2-1)} + \frac{a\pi}{2(a^2-1)} = \frac{\pi}{2(a+1)}$$


$$\frac{dl}{da} = \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+a^2x^2)} = \frac{\pi}{2(a+1)} \quad \mapsto \quad l = \frac{\pi}{2} \int \frac{da}{a+1} = \frac{\pi}{2} L(a+1) + C$$

La constante C se calcula particularizando para a = 0:

$$l_{a=0} = \int_0^{\infty} 0 dx = 0 = \frac{\pi}{2} L(1) + C \quad \mapsto \quad C = 0$$

Para calcular la integral solicitada se particulariza para a = 1:

$$l_{a=1} = \int_0^{\infty} \frac{\text{arc tg } x}{x(1+x^2)} dx = \frac{\pi}{2} L2$$

 Calcular $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx$

Sea $l(a,b) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx$

Derivando respecto al parámetro **b**

$$l'_b = \frac{\partial l}{\partial b} = \frac{\partial}{\partial b} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx = \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-ax^2+bx} dx \quad \bullet$$

Haciendo arreglos para integrar con mayor comodidad:

$$\bullet \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-ax^2+bx} dx = \frac{-1}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} -2ax e^{-ax^2+bx} dx = \frac{-1}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} (-2ax + b - b) e^{-ax^2+bx} dx =$$

$$= \frac{-1}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} (-2ax + b) e^{-ax^2+bx} dx + \frac{b}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx \quad \bullet\bullet$$

siendo: $\frac{-1}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} (-2ax + b) e^{-ax^2+bx} dx = \frac{-1}{2a} e^{-ax^2+bx} \Big|_{-\infty}^{\infty} = 0$

$$\bullet \bullet \quad I'_b = \frac{\partial I}{\partial b} = \int_{-\infty}^{\infty} x e^{-ax^2+bx} dx = \frac{b}{2a} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx = \frac{b}{2a} I$$

$$\frac{I'_b}{I} = \frac{b}{2a} \quad \rightarrow \quad \int \frac{I'_b}{I} db = \int \frac{b}{2a} db \quad \Rightarrow \quad \boxed{LI = \frac{b^2}{4a} + C}$$

Para calcular la constante C se particulariza para $b = 0$:

$$LI_{b=0} = L \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx \stackrel{\otimes}{=} L \sqrt{\frac{\pi}{a}} = 0 + C \Rightarrow \underline{C = L \sqrt{\frac{\pi}{a}}}$$

$$\otimes \text{ donde } \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t} dt = \frac{1}{\sqrt{a}} \Gamma(1/2) = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\text{Por tanto, } LI = \frac{b^2}{4a} + L \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad \mapsto \quad LI = L e^{b^2/4a} + L \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad \mapsto \quad \boxed{I = \sqrt{\pi/a} e^{b^2/4a}}$$

PORTAL ESTADÍSTICA APLICADA

Normal

t Student

Chi-cuadrado

Integración

Distribuciones

Probabilidad

Intervalos

Contrastes

Contraste Regresión

Mercado Bursátil

Ejercicios Distribuciones

Estimadores

MÉTODOS DE INTEGRACIÓN

Matrices, Determinantes

Inmediatas

Partes

Trigonométricas

Hermite

Racionales

Irracionales

Paramétrica

Gamma

Beta

Hiperbólicas